


Stagione influenzale 2007/2008

Sorveglianza epidemiologica

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. L'obiettivo è stimare l'incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da descrivere durata e intensità dell'epidemia. L'incidenza è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti per settimana.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



La fascia d'età maggiormente colpita è quella tra 0 e 4 anni in cui il livello di massima incidenza è stato di 23,05 casi su 1000 assistiti, nella fascia 5-14 anni di 17,46, in quella 15-64 anni è di 6,01 e di 2,71 tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni.

La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza in Italia nella stagione influenzale 2007/2008.


Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2007-42	822	209	1075194	0,19	30	0,47	19	0,15	126	0,19	34	0,16
2007-43	839	353	1112987	0,32	44	0,67	54	0,40	209	0,30	46	0,21
2007-44	857	290	1133791	0,26	37	0,55	39	0,29	158	0,22	56	0,25
2007-45	885	477	1172206	0,41	91	1,30	79	0,55	249	0,34	58	0,25
2007-46	899	608	1191998	0,51	98	1,40	101	0,71	328	0,44	81	0,34
2007-47	914	729	1197422	0,61	118	1,65	127	0,88	394	0,53	90	0,38
2007-48	885	914	1157504	0,79	149	2,10	171	1,19	483	0,68	111	0,49
2007-49	922	1079	1206693	0,89	165	2,27	195	1,32	598	0,80	121	0,50
2007-50	916	1444	1198903	1,20	235	3,27	263	1,81	789	1,06	157	0,66
2007-51	903	2224	1175626	1,89	334	4,63	508	3,55	1187	1,63	195	0,84
2007-52	812	3126	1070366	2,92	364	5,88	603	4,77	1866	2,80	293	1,36
2008-01	913	5468	1198250	4,56	548	7,63	830	5,74	3569	4,80	521	2,18
2008-02	940	7390	1234887	5,98	853	11,82	1241	8,48	4627	6,01	669	2,71
2008-03	936	8017	1225495	6,54	1473	19,77	1983	13,16	3960	5,22	601	2,48
2008-04	914	8346	1200731	6,95	1596	22,18	2392	16,44	3799	5,09	559	2,36
2008-05	917	8701	1206563	7,21	1643	23,05	2535	17,46	3925	5,23	598	2,50
2008-06	909	8287	1192437	6,95	1566	22,55	2449	17,37	3664	4,92	608	2,56
2008-07	905	7839	1185316	6,61	1350	19,00	2153	15,15	3736	5,07	600	2,55
2008-08	895	7421	1174934	6,32	1184	17,02	2004	14,42	3664	5,00	569	2,43
2008-09	887	6555	1165703	5,62	1084	15,75	1723	12,48	3223	4,43	525	2,27
2008-10	872	4705	1140119	4,13	742	10,91	1224	9,02	2324	3,27	415	1,84
2008-11	826	2978	1082848	2,75	459	7,26	733	5,75	1528	2,26	258	1,19
2008-12	793	2009	1045931	1,92	286	4,81	459	3,89	1055	1,60	209	0,99
2008-13	787	1390	1040374	1,34	192	3,29	262	2,25	779	1,19	157	0,75
2008-14	759	966	999892	0,97	128	2,23	162	1,42	548	0,87	128	0,64
2008-15	711	644	941501	0,68	81	1,54	101	0,96	377	0,63	85	0,45
2008-16	622	394	827900	0,48	59	1,34	49	0,55	239	0,45	47	0,28
2008-17	433	176	568094	0,31	27	0,87	23	0,36	110	0,31	16	0,14

La sorveglianza della stagione influenzale 2007/2008 è riferita ad una popolazione di assistiti così suddivisa per fascia di età:

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2007-42	64169	129981	666481	214563	1075194
2007-43	65623	133821	691445	222098	1112987
2007-44	66954	136386	704275	226176	1133791
2007-45	69957	142702	726430	233117	1172206
2007-46	69756	142611	740577	239054	1191998
2007-47	71311	143526	743373	239212	1197422
2007-48	71020	143171	714527	228786	1157504
2007-49	72786	147324	746894	239689	1206693
2007-50	71920	145566	742277	239140	1198903
2007-51	72095	143142	728036	232353	1175626
2007-52	61951	126398	666387	215630	1070366
2008-01	71783	144485	743483	238499	1198250
2008-02	72184	146368	769790	246545	1234887
2008-03	74520	150663	758265	242047	1225495
2008-04	71963	145479	746098	237191	1200731
2008-05	71273	145168	751043	239079	1206563
2008-06	69443	140989	744158	237847	1192437
2008-07	71063	142156	737231	234866	1185316
2008-08	69558	138936	732264	234176	1174934
2008-09	68834	138103	727147	231619	1165703
2008-10	67990	135699	710849	225581	1140119
2008-11	63184	127397	676092	216175	1082848
2008-12	59443	117970	657930	210588	1045931
2008-13	58424	116630	655639	209681	1040374
2008-14	57341	113985	628134	200432	999892
2008-15	52677	105108	593877	189839	941501
2008-16	44056	89412	526642	167790	827900
2008-17	30898	63080	358056	116060	568094

In questa stagione hanno inviato dati in media 845 medici sentinella a settimana, con un massimo di 940 e un minimo di 433. La popolazione in sorveglianza è stata, mediamente, di 1.111.559 assistiti.

Il grafico riporta l'incidenza delle sindromi influenzali nelle stagioni 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.



La curva epidemica della stagione influenzale 2007/2008 ha raggiunto il picco alla quinta settimana del 2008 con 7,21 casi su 1000 assistiti.

Il livello massimo di incidenza raggiunto, in questa stagione influenzale, si colloca ad un livello intermedio tra la stagione di maggiore incidenza, (2004/2005), e quella in cui è stato osservato il più basso livello di incidenza (2005/2006).