

Supplementary Materials for

The first SARS-CoV-2 wave among pregnant women in Italy: results from a prospective population-based study

**Serena Donati, Edoardo Corsi, Alice Maraschini, Michele Antonio Salvatore
and the ItOSS COVID-19 Working Group**

Corresponding author:

Serena Donati, Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italy.

Published on

Ann Ist Super Sanità 2021 Vol. 57, No. 4: 272-285

DOI: 10.4415/ANN_21_04_02

This PDF file includes:

Table 1S

Reasons for hospital admission

Table 2S

Symptoms at time of diagnosis by COVID-19 disease severity

Table 1S
Reasons for hospital admission

	Women with ongoing pregnancy (n = 124)		Women who gave birth (n = 424)		Total (N = 548)	
	n	%	n	%	N	%
COVID-19	93	75.0	60	14.2	153	27.9
Delivery or other obstetric reasons	31	25.0	364	85.8	395	72.1

Table 2S
Symptoms at time of diagnosis by COVID-19 disease severity

Symptom	Mild ^{a,*} (n = 395)		Moderate ^b (n = 123)		Severe ^c (n = 30)		Total (N = 548)	
	n	%	n	%	n	%	N	%
Fever	87	22.3	85	69.1	25	83.3	197	36.3
Cough	76	19.5	81	65.9	26	86.7	183	33.7
Tiredness	42	10.8	52	42.3	20	66.7	114	21.0
Dyspnoea	21	5.4	36	29.3	23	76.7	80	14.7
Muscle/joint pain	29	7.4	28	22.8	11	36.7	68	12.5
Sore throat	25	6.4	22	17.9	7	23.3	54	9.9
Rhinorrhoea	25	6.4	13	10.6	6	20.0	44	8.1
Vomiting/diarrhoea	18	4.6	19	15.4	3	10.0	40	7.4
Headache	11	2.8	17	13.8	7	23.3	35	6.4
Chest pain	10	2.6	13	10.6	3	10.0	26	4.8
Conjunctivitis	5	1.3	2	1.6	0	0.0	7	1.3
No symptoms	244	62.6	14	11.4	0	0.0	258	47.5

^aAbsence of COVID-19 pneumonia.

^bConfirmed COVID-19 pneumonia requiring at most oxygen therapy.

^cConfirmed COVID-19 pneumonia requiring mechanical ventilatory support and/or ICU admission.

*5 missing values.