

Supplementary Materials for

Pain prevalence and severity in an Italian university hospital: a cross-sectional study

**Martino Bussa, Federico Ambrogi, Paola Rebora, Aurelia D'Acquisto
and Maria Teresa Cuppone**

Corresponding author:

Martino Bussa, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milan, Italy. E-mail: m.bussa@campus.unimib.it.

Published on

Ann Ist Super Sanità 2026 Vol. 62, No. 2: 130-140
DOI 10.4415/ANN_26_02_05

This PDF file includes:

Supplementary Table 1. Prevalence of pain and socio-demographic and clinical characteristics of patients
(N=229)

Supplementary Table 1

Prevalence of pain and socio-demographic and clinical characteristics of patients (N=229)

Characteristics	No pain (%) 37 (16)	Mild pain (%) 50 (22)	Moderate pain (%) 120 (52)	Severe pain (%) 22 (10)	χ^2 , p-value
Age					
≤76 years	26 (16.0)	41 (25.2)	83 (50.9)	13 (8.0)	
>76 years	11 (16.7)	9 (13.64)	37 (56.1)	9 (13.6)	p=0.20
Gender					
Men	25 (20.3)	27 (22.0)	62 (50.4)	9 (7.3)	
Women	12 (11.3)	23 (21.7)	58 (54.7)	13 (12.3)	p=0.21 [†]
Ethnicity					
Non-Caucasian	3 (30.0)	3 (30.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	
Caucasian	34 (15.5)	47 (21.5)	116 (53.0)	22 (10.1)	p=0.40 [†]
Marital status					
Unmarried	13 (27.7)	9 (19.2)	23 (48.9)	2 (4.3)	
Married	18 (14.2)	32 (25.2)	64 (50.4)	13 (10.2)	
Divorced/widowed	6 (10.9)	9 (16.4)	33 (60.0)	7 (12.7)	p=0.34
Education					
Lower	15 (12.8)	23 (19.7)	64 (54.7)	15 (12.8)	
Higher	22 (19.6)	27 (24.1)	56 (50.0)	7 (6.3)	p=0.17
Wards					
Medicine	15 (25.0)	12 (19.7)	30 (49.2)	4 (6.6)	
Surgery	11 (9.5)	27 (23.3)	63 (54.3)	15 (12.9)	
Rehabilitation	11 (21.2)	11 (21.2)	27 (51.9)	3 (5.8)	p=0.13 [†]
Days from admission					
1-3 days	13 (16.1)	22 (27.2)	37 (45.7)	9 (11.1)	
4-6 days	6 (10.7)	7 (12.5)	38 (67.9)	5 (8.9)	
≥7 days	17 (18.9)	21 (23.3)	44 (48.9)	8 (8.9)	p=0.20

[†]Fisher exact test.