

27 gennaio 2023

Epidemia COVID-19

Aggiornamento epidemiologico e monitoraggio del rischio

Silvio Brusaferrò
Istituto Superiore di Sanità



www.iss.it/presidenza




Situazione epidemiologica in Italia




www.iss.it/presidenza

Casi notificati al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia



Curva epidemica dei casi di COVID-19 segnalati in Italia per data di prelievo o diagnosi (verde) e per data di inizio dei sintomi (blu)
Nota: il numero dei casi riportato negli ultimi giorni (riquadri grigi) deve essere considerato provvisorio sia per possibili ritardi di segnalazione che di diagnosi.



www.iss.it/presidenza




Data di ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2023

Stima nazionale dell'Rt sintomi (11/01), Rt ospedalizzazioni (17/1) e Rt «augmented» (17/1) calcolati con dati al 25/1/2023


Sintomi: 0,69
(IC95%: 0,69-0,69)
all'11 gennaio 2023

Augmented: 0,79
(IC95%: 0,78-0,79)
al 17 gennaio 2023


Ospedalizzazioni: 0,72
(IC95%: 0,71-0,72)
al 17 gennaio 2023



In diminuzione l'incidenza in tutte le Regioni/PPAA, nuovi casi presenti su tutto il territorio nazionale negli ultimi 7 giorni




CONFRONTO TRA IL NUMERO CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB) DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER REGIONE/PA NEL PERIODO 16-22/01/2023 E 9-15/01/2023




INCIDENZA PER 100.000 CASI DI COVID-19 DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER PROVINCIA DOMICILIO/RESIDENZA

In diminuzione l'incidenza in quasi tutte le fasce d'età



CONFRONTO TRA IL NUMERO CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB) DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER FASCIA D'ETA' NEL PERIODO 16-22/01/2023 E 9-15/01/2023

Età media per evento



53 anni alla diagnosi

79 anni all'ospedalizzazione

75,5 anni al ricovero in TI

84 anni al decesso

Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13 - Aggiornamento del 26 gennaio 2023

Regione	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 6-12 gennaio 2023	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 13-19 gennaio 2023	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 20-26 gennaio 2023	% OCCUPAZIONE PL AREA MEDICA DA PAZIENTI COVID al 26/01/2023	% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 n.105) al 26/01/2023
Abruzzo	232,7	170,9	178,5	8,5%	2,2%
Basilicata	145,6	77,6	48,5	8,3%	0,0%
Calabria	213,1	117,4	77,3	14,0%	5,3%
Campania	143,6	85	52,2	7,0%	2,0%
Emilia Romagna	120,6	73,4	58,0	8,0%	3,5%
Friuli Venezia Giulia	154,3	97,2	69,2	6,8%	3,4%
Lazio	167,7	109	87,4	8,4%	1,9%
Liguria	94,1	56,7	44,4	9,1%	3,1%
Lombardia	92,8	61,2	53,6	3,3%	1,4%
Marche	149,2	86,9	50,9	9,1%	0,9%
Molise	201,5	110,1	58,5	3,4%	5,1%
PA di Bolzano	100,4	89,2	80,8	3,8%	0,0%
PA di Trento	106,8	69,2	51,1	6,4%	2,2%
Piemonte	71,7	43,9	36,0	2,6%	0,6%
Puglia	191,4	112,5	66,6	7,8%	2,7%
Sardegna	120	80,2	56,7	4,2%	1,0%
Sicilia	209,4	112,4	66,8	13,6%	3,5%
Toscana	108,9	69,1	51,4	4,3%	1,2%
Umbria	207,9	148,7	99,7	19,8%	2,4%
Valle d'Aosta	60,8	32,4	23,5	6,0%	5,9%
Veneto	177,7	113,6	87,0	5,1%	1,6%
ITALIA	143	88	65	6,4%	2,1%

Occupazione dei posti letto (attivi e attivabili ai sensi del DL 105 del 23 luglio 2021) in terapia intensiva e in area medica al 26/1/2023


TERAPIA INTENSIVA

Il tasso di occupazione a livello nazionale **è in diminuzione** al 2,1% rispetto alla settimana precedente (2,3%). Il numero di persone ricoverate in queste aree **è in diminuzione** da 227 (19/1/2023) a 205 (19/1/2023).

AREA MEDICA

Il tasso di occupazione a livello nazionale **è in diminuzione** al 6,4% rispetto alla settimana precedente (7,9%). Il numero di persone ricoverate in queste aree **è in diminuzione** da 5.003 (19/1/2023) a 4.081 (19/1/2023).

Distribuzione percentuale dei lignaggi Omicron per settimana di campionamento, Italia (I-Co-Gen, dati aggiornati al 25 gennaio 2023)




Il dato relativo alle ultime due settimane di campionamento disponibili (linea tratteggiata) è da considerarsi non ancora consolidato
I lignaggi illustrati risultano inclusivi dei relativi sotto-lignaggi identificati

Sebbene i dati siano ancora in fase di consolidamento, nell'ultima settimana di campionamento disponibile (16/01/2023 – 22/01/2023) si evidenzia la seguente distribuzione delle varianti circolanti:

- OMICRON	100%
di cui:	
- BA.5	81,25%
- BA.2	10,71%
- Ricombinante omicron/omicron	8,04%

Distribuzione percentuale dei sotto-lignaggi Omicron per settimana di campionamento, Italia (I-Co-Gen, dati aggiornati al 25 gennaio 2023)




Sebbene i dati siano ancora soggetti a fluttuazione, nell'ultima settimana di campionamento disponibile

(16/01/2023 – 22/01/2023),

la proporzione di sequenziamenti attribuibili ai sotto-lignaggi attenzionati **BQ.1.n** è risultata pari a 62,50%, mentre la proporzione di sequenziamenti attribuibili ai sotto-lignaggi **XBB.n** è risultata pari a 2,68%.

XBB.1.5 è risultata, nell'ultima settimana di campionamento, pari a 1,79% sul totale di sequenziamenti; **CH.1.1** pari a 4,46%.

Distribuzione percentuale settimanale dei casi di REINFEZIONE da SARS-CoV-2 sul totale dei casi diagnosticati per data di prelievo/diagnosi a partire da gennaio 2022



MONITORAGGIO

Indicatori per la valutazione del rischio



www.iss.it/presidenza

Analisi del rischio e scenario per Regione/PA

Regione.PA	Stima di Rt- puntuale (calcolato al 11/01/2023)	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio
Abruzzo	0.74 (CI: 0.69-0.8)	1	Bassa
Basilicata	1.19 (CI: 0.78-1.68)	1	Bassa
Calabria	0.75 (CI: 0.67-0.83)	1	Bassa
Campania	0.69 (CI: 0.65-0.74)	1	Bassa
Emilia-Romagna	0.6 (CI: 0.56-0.64)	1	Moderata #
FVG	0.71 (CI: 0.66-0.74)	1	Bassa
Lazio	0.81 (CI: 0.77-0.87)	1	Bassa
Liguria	0.54 (CI: 0.51-0.58)	1	Moderata #
Lombardia	0.67 (CI: 0.65-0.7)	1	Bassa
Marche	0.78 (CI: 0.72-0.85)	1	Bassa
Molise	1.09 (CI: 0.68-1.65)	1	Bassa
Piemonte	0.76 (CI: 0.5-1.1)	1	Bassa
PA Bolzano/Bozen	0.88 (CI: 0.78-0.98)	1	Bassa
PA Trento	0.66 (CI: 0.6-0.73)	1	Bassa
Puglia	0.83 (CI: 0.8-0.86)	1	Moderata #
Sardegna	0.81 (CI: 0.74-0.89)	1	Bassa
Sicilia	0.79 (CI: 0.75-0.83)	1	Bassa
Toscana	0.7 (CI: 0.67-0.72)	1	Bassa
Umbria	0.83 (CI: 0.72-0.94)	1	Bassa
V.d'Aosta/V.d'Aoste	0.49 (CI: 0.32-0.7)	1	Bassa
Veneto	0.61 (CI: 0.59-0.63)	1	Bassa

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni;

*ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"; # presenza di molteplici allerte di resilienza;



Headline della Cabina di Regia (27 gennaio 2023)

L'incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in diminuzione rispetto alla precedente settimana di monitoraggio. Si riduce l'impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in diminuzione sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive.

Si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.

L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia. Si sottolinea l'importanza dei richiami vaccinali negli anziani e nei gruppi di popolazione più fragili, anche considerando la progressiva riduzione dell'effetto protettivo contro l'infezione per SARS-CoV-2 con il passare del tempo, sia dall'infezione pregressa che dalla vaccinazione.

Grazie.



www.iss.it/presidenza