

LA SINDROME FETO-ALCOLICA

01

SPETTRO DEI DISORDINI FETOALCOLICI (FASD)

La **FASD** (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) è un insieme di condizioni causate dall'**esposizione prenatale all'alcol**. Può includere una serie di **problemi fisici, comportamentali e cognitivi** di diversa gravità.

Le persone con FASD possono avere difficoltà nell'**apprendimento**, problemi di **attenzione** e **caratteristiche fisiche distintive**.



SINDROME FETOALCOLICA (FAS)

02

La **FAS** (Fetal Alcohol Syndrome) è la forma completa dei **disturbi da esposizione fetale all'alcol** con tutti i difetti associati: bassa statura, microcefalia, facies dismorfica e ritardo mentale.

03

CARATTERISTICHE FISICHE DI FAS

Gli **occhi** appaiono **più piccoli** e **distanti** e le **orecchie** sono **basse** e **girate** verso la parte posteriore della testa.

Il **setto nasale** è **corto** e **allargato** e le **narici** tendono ad essere **prominenti**.

Il **prolabio** (o filtro), ossia il solco tra il naso e il labbro superiore, è **esteso** e **appiattito**. Il **labbro superiore** è **sottile**.



EFFETTI SUL BAMBINO

04

- Ritardo nella crescita ●
- Malformazioni facciali ●
- Problemi neurologici e cognitivi ●
- Difficoltà di apprendimento e comportamento ●

05

PREVENZIONE

La **prevenzione** della **FASD** si basa sull'**astensione totale dall'alcol prima e durante tutta la gravidanza**.

Non esiste una quantità sicura di alcol né un momento in cui il consumo sia innocuo per il feto. Bere anche piccole dosi può causare **danni permanenti**.

Informarsi e **sensibilizzare** sull'importanza di non assumere alcol in gravidanza è fondamentale per proteggere lo sviluppo e la salute del bambino.

