Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3
Report settimanale

Settimana 121

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 27 agosto 2025

28 agosto 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

• Al 27/08/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,1% (668 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (1,1% al 20/08/2025) (tab.1, fig.1). Sostanzialmente stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (23 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 20/08/2025) (tab.2, fig.2).

• I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 22 e 26 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nella fascia >90 pari a 1 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

• L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 27 agosto 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 12/08/2025, è pari a 1,35 (1,15-1,58), stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=1,34 (1,1-1,61) al 05/08/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

• L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 21/08/2025 - 26/08/2025 è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (2 caso per 100.000 abitanti nella settimana 14/08/2025 - 20/08/2025) (tab.3).

• L'incidenza settimanale (21/08/2025 - 26/08/2025) dei casi diagnosticati è sostanzialmente stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

• Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 63 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

• La percentuale di reinfezioni è del 39% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

• In base ai dati di sequenziamento presenti nella piattaforma nazionale I-Co-Gen, nell'ultimo mese di campionamento consolidato (luglio 2025, dati al 24/08/2025) si evidenzia la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG (fig.9), variante sotto monitoraggio attualmente in crescita su scala globale (https://data.who.int/dashboards/covid19/summary?n=o).

• Tra i diversi lignaggi identificati nel mese di luglio 2025, XFG.3 è risultato prevalente (27%, fig.10).

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 27 agosto 2025 | Data di analisi: 28 agosto 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 27/08/2025 (A)	Posti letto totali area medica 27/08/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 27/08/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 20/08/2025
Abruzzo	0	1 382	0.0	0.1
Basilicata	1	333	0.3	0.6
Calabria	3	851	0.4	0.1
Campania	80	3 714	2.2	2.2
ER	176	9 001	2.0	1.7
FVG	6	1 277	0.5	0.9
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	33	1 251	2.6	2.4
Lombardia	23	10 457	0.2	0.2
Marche	12	973	1.2	1.7
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	12	6 794	0.2	0.2
PA Bolzano	2	500	0.4	0.2
PA Trento	2	517	0.4	0.4
Puglia	5	2 024	0.2	0.1
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	17	5 033	0.3	0.3
Umbria	8	662	1.2	1.4
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	129	6 000	2.1	2.2
ITALIA	**668**	**61 844**	**1.1**	**1.1**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 27/08/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 27/08/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 27/08/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 20/08/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	3	889	0.3	0.1
FVG	1	175	0.6	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	163	0.0	0.0
Lombardia	1	1 810	0.1	0.1
Marche	1	206	0.5	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.5
Umbria	2	80	2.5	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	4	1 000	0.4	0.4
ITALIA	**23**	**8 786**	**0.3**	**0.2**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 19 maggio 2025



Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 19 maggio 2025



Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 19 maggio 2025



Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 20 agosto 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 21/08/2025 - 27/08/2025	Incidenza* 21/08/2025 - 27/08/2025	Incidenza 14/08/2025 - 20/08/2025	Incidenza 07/08/2025 - 13/08/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	0	0	<0,5	<0,5	0
Basilicata	3	1	1	0	0
Calabria	20	1	<0,5	0	-
Campania	227	4	2	2	100
ER	183	4	4	3	0
FVG	24	2	3	2	-33.3
Lazio	138	2	2	2	0
Liguria	65	4	2	3	100
Lombardia	333	3	3	2	0
Marche	15	1	1	1	0
Molise	2	1	1	1	0
Piemonte	41	1	<0,5	1	-
PA Bolzano	10	2	2	2	0
PA Trento	7	1	1	1	0
Puglia	100	3	1	1	200
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	5	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	49	1	1	1	0
Umbria	32	4	3	2	33.3
Valle d'Aosta	4	3	<0,5	0	-
Veneto	133	3	3	1	0
ITALIA	**1 391**	**2**	**2**	**1**	**0**

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 19 maggio 2025



Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 19 maggio 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento