


E PER CHI GUIDA ...

E per le persone anziane che ancora guidano, va sempre raccomandata un'estrema cautela nell'assunzione di alcol. Prima della guida è meglio astenersi totalmente dall'assumere alcolici!



In qualunque fase della vita proteggersi dalle conseguenze negative dell'alcol è un investimento in salute e in sicurezza per tutti

Numeri utili:

Telefono Verde Alcol

Istituto Superiore di Sanità

tel. 800 632000

AICAT-Associazione Italiana dei Club

degli Alcolisti in Trattamento

tel. 800 974250

AA-Alcolisti Anonimi

tel. 06 6636620

Gruppi Al-Anon/Alateen

per familiari ed amici di alcolisti

tel. 800 087897

Per approfondire:

www.salute.gov.it


www.epicentro.iss.it/alcol

www.dfc.unifi.it/sia

www.alcolonline.it

Con il contributo del Ministero della Salute - Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali - nell'ambito delle azioni di informazione e prevenzione da realizzare ai sensi della L. 125/2001, e con la collaborazione della Società Italiana di Alcologia.

Per informazioni:
alcol@iss.it




*Alcol
e.
Anziani*

L'ORGANISMO CAMBIA CON L'AVANZARE DELL'ETÀ

Consumare bevande alcoliche è un'abitudine diffusa nella società e fa parte della tradizione italiana. Con l'avanzare dell'età, tuttavia, è importante tenere presente che il fisico ha meno difese nei confronti dell'alcol.

In particolare, i cambiamenti sopraggiunti nell'organismo rendono le persone più vulnerabili all'alcol dopo i 65 anni per diversi motivi:

- si riduce la capacità di metabolizzare (digerire) l'alcol
- si riduce la quantità di acqua presente nell'organismo e si ha, quindi, una minore capacità di diluire l'alcol e di tollerarne gli effetti



Alcol e Anziani

IL CONSUMO GIORNALIERO CONSENTITO

Per ridurre il rischio per la salute degli ultra 65enni, è importante rispettare e **non superare il limite giornaliero di consumo pari ad una unità alcolica**

**1 unità alcolica corrisponde a
1 bicchiere circa di:**

	birra 4,5° bicchiere 330 ml
	vino 12° bicchiere 125 ml
	aperitivo alcolico 18° bicchiere 80 ml
	cocktail alcolico 36° bicchiere 40 ml

A parità di quantità consumate, i livelli di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia), possono però variare da persona a persona in funzione di alcune variabili:

- Il sesso: l'organismo femminile ha una capacità dimezzata, rispetto a quella maschile, di smaltire l'alcol ingerito;
- La massa corporea: nelle persone più magre, la ridotta quantità di grassi e di liquidi corporei rende più vulnerabili agli effetti dell'alcol;
- L'assunzione a stomaco pieno o vuoto: il cibo presente nello stomaco rallenta l'assorbimento dell'alcol.

ATTENZIONE ALLE INTERAZIONI ALCOL e FARMACI

Se si assumono farmaci (ad es. aspirina, antinfiammatori, antidolorifici, antibiotici e sedativi) bere alcol può provocare reazioni indesiderate, anche gravissime, oltre a ridurre o potenziare gli effetti dei farmaci assunti.

ALCOL e MALATTIE

Bere alcol può peggiorare le malattie croniche già presenti (ad es. malattie del fegato e del pancreas) o favorirne l'insorgenza. Nel caso di ipertensione, il consumo di alcol è fortemente controindicato.

**È bene chiedere sempre consiglio
al medico**