


## Decessi per malattie legate al fumo

OSSFAD – Istituto Superiore di Sanità

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il fumo è "la prima causa di morte facilmente evitabile", essendo responsabile ogni anno nel mondo della morte di 4,9 milioni di persone e ogni giorno di più di 13 mila decessi. Inoltre il tabagismo causerà 500 milioni di decessi nella popolazione attuale. La previsione dell'OMS è che, se non saranno adottate misure efficaci, le morti attribuibili al fumo potranno divenire 8,3 milioni nel 2030 e l'80% delle vittime si registrerà nei paesi a reddito medio e basso. (WHA -World Health Assembly 2007).

Sempre secondo l'OMS il tabacco uccide più dell'AIDS e della droga e nel 2015 le morti dovute al tabacco saranno il 10% del totale e supereranno del 50% quelle causate dall'AIDS.



In Europa si stimano 1,2 milioni di decessi l'anno attribuibili al fumo di tabacco ed il 20% di tutte le cause di morte sono attribuibili al fumo di sigaretta, inoltre un quarto delle morti per malattie cardiovascolari sono imputabili al fumo.

Nel nostro Paese la stima delle morti fumo-correlate ammonta ad 80.000 l'anno (di cui 66.289 per gli uomini e 13.267 per le donne). Oltre il 34% di tutte le cause di morte attribuibili al fumo di sigaretta colpisce soggetti di 35-69 anni. Inoltre coloro che decedono a causa del tabacco perdono in media 13 anni di speranza di vita, mentre nella mezza età (35-69 anni) gli anni di vita perduti salgono a 22.

In generale la mortalità attribuibile al fumo per tutte le cause è pari al 14,2%.

(Peto R., Lopez AD., Boreham J., Thun M., Mortality From Smoking In Developed Countries 1950-2000, revised 09-JUN-2006)

## Decessi per malattie legate al fumo: EUROPA

- ❖ 1,2 milioni di decessi/anno attribuibili al fumo di tabacco
- ❖ Il 20% di tutte le cause di morte sono attribuibili al fumo di sigaretta:
  - 35% tumori
  - 56% malattie cardiovascolari e respiratorie
  - 9% altre cause
- ❖ 1/4 delle morti per malattie cardiovascolari sono imputabili al fumo di sigaretta


## Decessi per malattie legate al fumo: ITALIA

- ❖ 80.000 decessi/anno attribuibili al fumo di tabacco
- ❖ Il 34,4% di tutte le cause di morte attribuibili al fumo di sigaretta colpisce soggetti di 35-69 anni

Henningfield J E, et al. CA Cancer J Clin. 2005; Redaz. E&P 2002; Peto R., Lopez AD, Boreham J, Thun M., Mortality: From Smoking in Developed Countries 1950-2000, revised 09-JUN-2006.

Secondo gli ultimi dati dell'OMS si stima che gli anni di vita perduti, dovuti a mortalità premature e agli anni di vita produttiva persi dovuti alla disabilità, sono pari a 7981 per un milione di persone.

Global burden of ill-health



**DALYs** = Disability Adjusted Life Years (the sum of years of potential life lost due to premature mortality and the years of productive life lost due to disability).