



GET READY FOR PLAIN PACKAGING

31
MAGGIO
2016

L'OSSERVATORIO FUMO, ALCOL E DROGA PRESENTA IL RAPPORTO NAZIONALE SUL FUMO 2016

Dott.ssa Roberta Pacifici

Osservatorio Fumo Alcol e Droga – OSSFAD
Istituto Superiore di Sanità





Giornata mondiale contro il tabacco 2016

GET READY FOR **PLAIN PACKAGING**

- No logos, colours, brand images or promotional information
- Pack surfaces in a standard colour
- Brand and product names in a standard colour and font
- Graphic health warnings used in conjunction with plain packaging

World Health Organization

31MAY:WORLDNOTOBACCODAY

STORIA DEL PACKAGING



1. Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 184

"Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003

2. Anno 2006. Il Nhs, il servizio sanitario britannico, decide di aggiungere alle scritte delle immagini shock. Per scegliere quali sono quelle più efficaci il Nhs ha lanciato un sondaggio online.

3. Decreto Legislativo 25 ottobre 2012, «Recepimento della direttiva 2012/9/UE relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti del tabacco»

4. Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6

«Recepimento della direttiva 2014/40 UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione ed alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37CE.»

D.Lgs 24 giugno 2003, n.184 - "Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco"

Base: fumatori

Quale scritta l'ha colpita di più?	2004	2005
Il fumo uccide	46,9	42,0
Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni	12,6	18,5
Fumare in gravidanza fa male al bambino	4,6	4,8
Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno	5,8	4,2
Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus	4,2	4,6
Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo	3,7	3,3
Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali	1,7	2,6
Il fumo invecchia la pelle	2,5	1,9
Il fumo crea un' elevata dipendenza, non iniziare	0,6	0,6
Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare	0,3	0,2
Nessuna in particolare	17,0	17,3

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2005



D.Lgs 24 giugno 2003, n.184 - "Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco"

Base: fumatori

L'impatto delle nuove scritte sui pacchetti di sigarette	2004	2005
Mi hanno colpito, ma non ho ridotto il numero di sigarette fumate	51.5	47.0
Non mi hanno colpito in modo particolare	38.9	40.8
Mi hanno colpito molto e ho ridotto il numero di sigarette fumate	9.6	12.2

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2005

STORIA DEL PACKAGING



1. Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 184

"Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003

2. Anno 2006. Il Nhs, il servizio sanitario britannico, decide di aggiungere alle scritte delle immagini shock. Per scegliere quali sono quelle più efficaci il Nhs ha lanciato un sondaggio online.

3. Decreto Legislativo 25 ottobre 2012, «Recepimento della direttiva 2012/9/UE relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti del tabacco»

4. Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6

«Recepimento della direttiva 2014/40 UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione ed alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37CE.»

Fra queste foto quale ritiene più efficace per convincere i giovani a non iniziare e per convincere i fumatori a smettere?

Base: totale campione



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2006

Fra queste foto quale ritiene più efficace per convincere i giovani a non iniziare e per convincere i fumatori a smettere?

(Analisi secondo il sesso)

<i>Base: totale campione</i>	TOTALE %	Maschi %	Femmine %
foto 1 (il fumo provoca cancro mortale ai polmoni)	24.4	22.5	26.2
foto 2 (il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico)	25.5	26.4	24.6
foto 3 (i fumatori muoiono prima)	11.8	13.3	10.4
foto 4 (il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus)	12.0	11.9	12.0
foto 5 (per aiutarvi a smettere di fumare: 0803 00 00 00)	3.9	4.3	3.6
foto 6 (il fumo invecchia la pelle)	4.0	3.9	4.2
foto 7 (il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza)	3.8	5.6	2.2
foto 8 (proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo)	14.6	12.2	16.7

* Questa domanda non è stata posta nella prima wave

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2006

STORIA DEL PACKAGING



1. Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 184

"Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003

2. Anno 2006. Il Nhs, il servizio sanitario britannico, decide di aggiungere alle scritte delle immagini shock. Per scegliere quali sono quelle più efficaci il Nhs ha lanciato un sondaggio online.

3. Decreto Legislativo 25 ottobre 2012, «Recepimento della direttiva 2012/9/UE relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti del tabacco»

4. Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6

«Recepimento della direttiva 2014/40 UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione ed alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37CE.»

DECRETO PER LE AVVERTENZE SUI PRODOTTI DI TABACCO

23-11-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 274

DECRETO 25 ottobre 2012.

Recepimento della direttiva 2012/9/UE della Commissione, relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti di tabacco.

IL MINISTRO

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;

Visto, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, della citata Direttiva che stabilisce che la Commissione europea provvede all'aggiornamento al progresso scientifico e tecnico delle avvertenze relative alla salute di cui all'allegato I della stessa Direttiva;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante: "Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco", e in particolare l'art. 6, comma 2, lettera b/);

Vista la Direttiva 2012/9/UE della Commissione europea del 7 marzo 2012 che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", che prevede che alle norme comunitarie non automaticamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie;

Considerate le nuove conoscenze scientifiche sugli effetti del consumo di tabacco e sui principi che devono guidare un'efficace etichettatura del tabacco;

Considerato che le Linee guida per l'imballaggio e l'etichettatura del tabacco, adottate nel novembre 2008 dalla III Conferenza delle parti della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, raccomandano di riesaminare e aggiornare periodicamente le norme di imballaggio e d'etichettatura dei prodotti del tabacco in base alle nuove conoscenze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le avvertenze supplementari di cui all'art. 6, comma 2, lettera b/), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 sono sostituite dalle seguenti:

- 1) Il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni;
 - 2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola;
 - 3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni;
 - 4) Il fumo causa attacchi cardiaci;
 - 5) Il fumo causa ictus e disabilità;
 - 6) Il fumo ostruisce le tue arterie;
 - 7) Il fumo aumenta il rischio di cecità;
 - 8) Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive;
 - 9) Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno;
 - 10) Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici;
 - 11) I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare;
 - 12) Smetti di fumare - Vivi per i tuoi cari
- (da completare, a rotazione, con l'inserimento dei seguenti riferimenti: "Telefono verde contro il fumo: 800 554088 - Istituto Superiore di Sanità"; "Ministero della salute: www.salute.gov.it");
- 13) Il fumo riduce la fertilità;
 - 14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza.

Art. 2.

1. Le sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono ancora essere immesse al consumo fino al 28 marzo 2014 e commercializzate fino al 28 marzo 2016.

2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere immessi al consumo fino al 28 marzo 2014 e commercializzati fino al 28 marzo 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soli prodotti che risultino già iscritti nella tariffa di vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

12A11953

Il Ministro della Salute con Decreto del 25 ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012) ha inserito tra le avvertenze supplementari sull'etichettatura dei prodotti del tabacco **"Telefono verde contro il fumo: 800554088 – Istituto Superiore di Sanità"**



STORIA DEL PACKAGING



1. Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 184

"Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003

2. Anno 2006. Il Nhs, il servizio sanitario britannico, decide di aggiungere alle scritte delle immagini shock. Per scegliere quali sono quelle più efficaci il Nhs ha lanciato un sondaggio online.

3. Decreto Legislativo 25 ottobre 2012, «Recepimento della direttiva 2012/9/UE relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti del tabacco»

4. Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6

«Recepimento della direttiva 2014/40 UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione ed alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37CE.»



Lei è favorevole o contrario

... all'**inserimento** di **immagini shock** sui pacchetti di sigarette?

% favorevoli



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2016

Effetti del Plain packaging (pacchetto neutro) in Australia (2014)

Research

Association between tobacco plain packaging and Quitline calls: a population-based, interrupted time-series analysis

Uno studio del 2014 pubblicato su *Medical Journal of Australia* riferisce che **dopo l'introduzione del pacchetto neutro è stato osservato un aumento del 78% delle chiamate al telefono verde contro il fumo.**

Young JM et al. Association between tobacco plain packaging and Quitline calls: a population-based, interrupted time-series analysis. MJA 2014; 200: 29–32.

Effetti del Pacchetto neutro in Australia (2015)

Australian adult smokers' responses to plain packaging with larger graphic health warnings
1 year after implementation: results from a national cross-sectional tracking survey

Melanie Wakefield, Kerri Coomber, Meghan Zacher, Sarah Durkin, Emily Brennan, Michelle Scollo

Fumatori (n=4240)

Obiettivo: valutare gli effetti del pacchetto neutro con avvertenze sanitarie, durante il primo anno di implementazione (dicembre 2012-novembre 2013).

Risultati:

- Ridotta percezione del fascino
- Minore soddisfazione
- Percezione di scarsa qualità del prodotto.

Wakefield M, Coomber K, Zacher M, et al. Australian adult smokers' responses to plain packaging with larger graphic health warnings 1 year after implementation: results from a national cross-sectional tracking survey. *Tob Control* 2015;24:ii17–ii25.

Pacchetto neutro nel mondo: revisione della letteratura (2016)

Downloaded from <http://bmjopen.bmj.com/> on April 20, 2016 - Published by group.bmj.com

Open Access

Research

BMJ Open Perceptions and impact of plain packaging of tobacco products in low and middle income countries, middle to upper income countries and low-income settings in high-income countries: a systematic review of the literature

Nicole Hughes,¹ Monika Arora,² Nathan Grills¹

Il Pacchetto neutro sembra essere efficace nel rendere poco attraente il fumo e il pacchetto nelle fasce di popolazione meno abbienti dei paesi ad alto reddito e supporta l'esigenza di implementarlo insieme con altre politiche di controllo del tabacco.


La ricerca non misura però gli effetti diretti del pacchetto neutro sulla prevalenza del fumo, la cui diminuzione è data dall'azione sinergica di più politiche.

Ulteriori ricerche vanno condotte invece per quanto riguarda i paesi a basso e medio reddito.

Hughes N, Arora M, Grills N. Perceptions and impact of plain packaging of tobacco products in low and middle income countries, middle to upper income countries and low-income settings in high-income countries: a systematic review of the literature. BMJ Open 2016;6:e010391.




Tassi di prevalenza dei fumatori (14 anni e +) e le politiche per il controllo del tabacco implementate in Australia dal 1990



Australian Government, Department of Health. Tobacco key facts and figures. August 2015.

<http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/tobacco-kff#footnotes>

Australia: percentuali di fumatori 2001-2013



Source: Online Table 3.4.


Note: The 2001 survey did not include those aged 12-13; the 2001 total for people aged 12 or older is for people aged 14 or older.

Figure 3.3: Daily smokers, people aged 12 or older, by age, 2001 to 2013 (per cent)

Australian Institute of Health and Welfare 2014. National Drug Strategy Household Survey detailed report 2013.

Drug statistics series no. 28. Cat. no. PHE 183. Canberra: AIHW. <http://www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=60129549848>

Prevalenza di fumatori negli stati australiani 2001-2013



NSW: New South Wales; VIC: Victoria; QLD: Queensland; WA: Western Australia; SA: South Australia; TAS: Tasmania; ACT: Australian Capital Territory; NT: Northern Territory; AUST: Australia


Scollo, MM and Winstanley, MH. Tobacco in Australia: Facts and issues. Melbourne: Cancer Council Victoria; 2015. Available from www.TobaccoInAustralia.org.au

Nessuno degli scenari previsti dall'industria del tabacco contro il pacchetto neutro si è verificato:

- "As Big Tobacco desperately tries to misrepresent the impact of plain packaging in Australiayou can't believe a word this industry says Quit Victoria Policy Manager K. Lindorff."
- Cancer Council Victoria CEO, Todd Harper, said "the tobacco industry's failed doomsday predictions stood in stark contrast to the early signs that plain packaging was having an impact in Australia".
- "The tobacco industry has continued to use flawed reports and misleading data to try and stop other countries and in particular the UK from following our lead," Mr Harper said.
- "While prepared to spend big bucks on lobbying and legal action, this industry has no regard for the 15,000 lives lost every year to smoking."

<http://www.cancervic.org.au/about/media-releases/2014-media-releases/august-2014/tobacco-industry-plain-packaging-predictions-a-bust.html>

Pacchetto neutro in Europa



- Dopo l'Australia, in cui già è in vigore dal 2012, il pacchetto neutro entra in vigore in Francia, Regno Unito e Irlanda da maggio 2016
- Dal 2017 sarà illegale la vendita di pacchetti non neutri in questi paesi europei

I NUOVI DIVIETI





DIVIETO DI FUMO

- IL DIVIETO DI FUMO E' ESTESO anche alle **pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici** e alle pertinenze esterne dei **reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria** delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.




- IL DIVIETO È ESTESO al **conducente di autoveicoli**, in sosta o in movimento, e ai **passengeri a bordo** degli stessi **in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.**

LEI SAREBBE FAVOREVOLE ALL'ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE NELLE AREE APERTE DEGLI OSPEDALI?




% molto + abbastanza favorevole




LEI SAREBBE FAVOREVOLE ALL'ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE NELLE AUTO IN PRESENZA DI MINORI?



% molto + abbastanza favorevole





DIVIETO DI VENDITA



➤Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene non meno di 30 g di tabacco.

➤ Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.



Lei è favorevole o contrario

... all'**eliminazione** dal mercato dei
pacchetti da 10 sigarette e delle buste di
tabacco piccole (30g)?

% favorevoli

Totale
campione

54,9%



Fumatori

27,8%

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2016

Lei è favorevole o contrario

... all'inasprimento delle **multe** per i tabaccaia che **vendono sigarette ai minori**?

% favorevoli

Totale
campione

88,7%




Fumatori

83,6%

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2016


Rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro per area di residenza

PASSI 2008-2015. Modelli serie storiche da valori mensili



Rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici per area di residenza

PASSI 2008-2015. Modelli serie storiche da valori mensili



* p value < 0.05

Sistema di Monitoraggio dell'applicazione del DLgs di recepimento della direttiva 2014/40/UE e di Valutazione dei suoi Effetti sui comportamenti associati alla Salute (MADES)

Obiettivo: Monitorare il recepimento della direttiva e valutare i suoi effetti sul tabagismo

AZIONI:

- ✓ Sistema di Sorveglianza Passi [2].
- ✓ Indagini DOXA 2010-2017.
- ✓ Indagini ISTAT Multiscopo 2001-2017 sulla prevalenza di fumo in Italia.
- ✓ Schede semi-strutturate utilizzate dagli operatori del TVF dell'OssFAD
- ✓ Schede pazienti Centri Antifumo
- ✓ studio ENFASI-auto
- ✓ studio ENFASI-ospedali
- ✓ Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

UNITA' OPERATIVE:

ISS – Dipartimento del Farmaco – Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping

ISS- Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), Firenze

Università del Piemonte Orientale (UPO)

ISS- Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CNSC)

Revisione sistematica Cochrane Tobacco Addiction Group (2016)

**Legislative smoking bans for reducing harms from
secondhand smoke exposure, smoking prevalence and
tobacco consumption (Review)**

Frazer K, Callinan JE, McHugh J, van Baarsel S, Clarke A, Doherty K, Kelleher C



**Revisione di studi
sull'efficacia dei divieti
legislativi sul fumo per
ridurre i danni del fumo
passivo e la prevalenza
dell'abitudine al fumo:
evidenze da 21 paesi
sulla base di 77 studi.**

Frazer K, Callinan JE, McHugh J, van Baarsel S, Clarke A, Doherty K, Kelleher C. Legislative smoking bans for reducing harms from secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco consumption. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2016, Issue 2. Art. No.: CD005992. DOI: 10.1002/14651858.CD005992.pub3.

Risultati




Vi sono prove evidenti dell'**efficacia dell'impatto dei divieti di fumo** nel migliorare la salute cardiovascolare, in particolare nella **riduzione dei ricoveri per sindrome coronarica acuta e della mortalità correlata.**

L'impatto dei divieti sulla salute respiratoria, sulla riduzione dei fumatori e del numero di sigarette consumate è invece poco evidente.

LE VENDITE DEI PRODOTTI DEL TABACCO IN ITALIA



Vendite di sigarette in Italia: ultimi 17 anni



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2016

Il trend delle vendite di tabacchi lavorati in Italia: anni 2003-2015



Prodotto (tonnellate)	2003	2004	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Var.ne 2015/14
Sigarette	101.581	98.843	92.822	89.148	87.031	85.500	78.740	74.041	74.441	73.824	-1,0
Trinciati	531	659	777	1.558	2.000*	2.800	4.076	4.056	4.142	4.340	+5,0
Sigari	629	668	647	640	768	810	851	833	852	860	+1,0
Sigaretti	413	424	429	769	910	840	827	798	786	775	-1,0
Totale	103.153	100.606	94.675	92.115	90.709	89.950	84.494	79.728	80.221	79.799	-1,0

* dal 2010 AAMS rileva i volumi dei trinciati separando quelli destinati alla fabbricazione delle sigarette RYO



IL FUMO IN ITALIA 2016



Indagine DOXA effettuata per conto
dell'Istituto Superiore di Sanità,
in collaborazione con:
L'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Distribuzione percentuale del campione in base all'abitudine al fumo *(Analisi secondo il sesso)*



Totale Italiani (15+ anni):
52,4 milioni



Non Fumatori:
33,8 milioni
64,5%

Uomini:
14,1 milioni
55,9 %

Donne:
19,7 milioni
72,4%



Ex Fumatori:
7,1 milioni
13,5%

Uomini:
4,3 milioni
16,8%

Donne:
2,8 milioni
10,4%




Fumatori:
11,5 milioni
22,0%

Uomini:
6,9 milioni
27,3%

Donne:
4,6 milioni
17,2%


OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2016

Prevalenza del fumo di sigarette fra uomini e donne nelle varie classi d'età




OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2016


Prevalenza del fumo di sigarette fra gli uomini e le donne delle varie aree geografiche (%)



Distribuzione percentuale dei fumatori (analisi secondo l'area geografica)




Prevalenza del fumo di sigarette secondo le indagini DOXA condotte fra il 1975 e il 2016



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2016

Prevalenza del fumo di sigarette secondo le indagini DOXA condotte fra il 2002 e il 2016



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2016