

Giornata Mondiale contro il tabacco

promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità

Ripuliamo l'aria dal fumo

III Convegno Nazionale

Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale

31 maggio 2001

Rapporto annuale sul fumo in Italia - 2001


Piergiorgio Zuccaro, Roberta Pacifici

Osservatorio su Fumo, Alcol e Droga


Istituto Superiore di Sanità

Quantità di sigarette prodotte - 1999


(milioni di kg)



Quantità di sigarette prodotte e consumate - 1999 (milioni di kg)



Consumo di tabacco ed interventi legislativi in Italia, 1960-2000



Fonte: elaborazione ISS - Osservatorio su fumo, alcol e droga su dati ETI

Vendita delle sigarette nazionali ed estere in migliaia di Kg per deposito e variazione percentuale 2000/1998

	Sigarette nazionali			Sigarette estere			2000/1998 %		
	1998	2000		1998	2000		Nazionali	Estere	
Ancona	930	874		2316	2460		-6,02	6,2	Ancona
Bari	1278	1290		3531	5305		0,01	50,2	Bari
Bologna	2334	2052		4158	4552		-0,12	9,5	Bologna
Brescia	1192	1056		2272	2414		-0,11	6,3	Brescia
Cagliari	1623	1521		1397	1561		-0,06	11,7	Cagliari
Catania	1923	1770		2361	2551		-0,08	8,0	Catania
Crotone	738	673		1124	1249		-0,09	11,1	Crotone
Firenze	2133	1816		3999	4313		-0,15	7,9	Firenze
Genova	993	872		2590	2653		-0,12	2,4	Genova
Messina	449	392		603	637		-0,13	5,6	Messina
Milano	4054	3644		8522	9647		-0,10	13,2	Milano
Napoli	2254	2482		3913	8417		0,10	115,1	Napoli
Palermo	1561	1436		2365	2528		-0,08	6,9	Palermo
Pescara	943	854		1701	1843		-0,09	8,3	Pescara
Reggio C.	465	417		701	745		-0,10	6,3	Reggio C.
Roma	4937	4562		6890	7618		-0,08	10,6	Roma
Tortona	2174	1840		5369	5608		-0,15	4,5	Tortona
Trento	771	682		1150	1223		-0,12	6,3	Trento
Udine	407	385		1004	1094		-0,05	9,0	Udine
Venezia	1530	1386		3658	3907		-0,09	6,8	Venezia
Totali	32689	30004		59624	70325		-8,21	17,95	totali

**Vendita delle sigarette nazionali ed estere in migliaia di
Kg per deposito e variazione percentuale 2000/1998**

0,01	50,2	Bari
-0,09	11,1	Crotone
-0,10	13,2	Milano
0,10	115,1	Napoli
-0,08	10,6	Roma
-8,21	17,95	TOTALE


Incidenza totale della tassazione sulle sigarette nel mondo in % percentuale sul prezzo di vendita in 70 paesi (2000)

U. K.	86.1	Uzbekistan	60.0
Denmark	81.7	Switzerland	58.7
Sri Lanka	81.5	Canada - Average	57.8
Ireland	79.8	Malta	57.1
Portugal	79.7	Mexico	56.4
Finland	76.0	Venezuela	55.9
France	75.5	Thailand	55.9
Norway - Average	75.3	Namibia	55.2
Chile	75.3	Taiwan	53.0
Israel	75.2	Ghana	52.9
Italy	74.7	Kenya	52.1
Belgium	74.6	Hong Kong	51.1
Austria	74.0	Azores	50.2
New Zealand	73.5	Madeira	50.1
Brazil	73.5	Uganda	50.0
Argentina	73.0	Fiji	49.4
Greece	72.8	Jersey (KS)	49.0
Netherlands	71.9	Ecuador	48.7
Spain	71.4	Singapore	47.9
Germany	70.8	Guernsey (KS)	47.5
Sweden	70.3	South Africa	47.3
Luxembourg	68.6	El Salvador	46.0
Korea (South)	68.2	Trinidad & Tobago	44.2
Jordan	67.4	Jamaica	43.5
Mauritius	67.3	Lesotho	43.1
Croatia	67.1	Botswana	42.4
Uruguay	66.5	Canary Islands	40.0
Iceland	65.8	Swaziland	39.4
Australia	65.2	Panama	37.8
Barbados	64.7	Puerto Rico	33.2
Cyprus	63.8	Peru	31.3
Japan	61.2	Malaysia	30.2
Hungary	60.5	Gibraltar	27.8
Czech Republic	60.2	USA - Average	26.7
Slovenia	60.1	Dominican Republic	22.3

Incidenza totale media della tassazione in Europa, Canada e stati Uniti (2000)


EUROPA	CANADA	STATI UNITI
75,9%	57,8%	22,3%

Consumo di sigarette nazionali ed estere in Italia (1987-2000)




Fonte: elaborazione ISS - Osservatorio su Fumo, Alcol e Droga su dati ETI

Consumo di sigarette in base al contenuto di condensato 1990-2000




Marche più vendute in Italia nel 1999 **e relativo contenuto in mg di condensato**



N.B. Le sigarette rappresentate in tabella sono il 77,73% del totale delle sigarette vendute

Fumatori nel tempo 1980-1999



Fonte: elaborazione ISS - Osservatorio su fumo, alcol e droga su dati ISTAT


PSN 1998-2000

La prevalenza dei fumatori e la quantità quotidiana di sigarette fumate devono ridursi

PSN 1998-2000

La prevalenza dei fumatori e la quantità quotidiana di sigarette fumate devono ridursi

Percentuale fumatori in Italia (> 14 anni)



Vendita sigarette in milione di kg

1998	1999	2000	2000/1998
92	97	100	8,7%

PSN 1998-2000

La frequenza delle donne che fumano durante la gravidanza deve tendere a zero

Indagine sulle madri di bambini che nel 1999 avevano un'età compresa tra 0-5 anni

25,7% fumava prima della gravidanza

62% ha sospeso durante la gravidanza

29,6% ha diminuito il numero di sigarette

8,4% ha continuato a fumare

Istat 2001

PSN 1998-2000

*Deve ridursi la prevalenza dei fumatori
fra gli adolescenti*

Fumatori classe d'età 14-24

	1998	1999
<i>Maschi</i>	26,6 %	27,4 %
<i>Femmine</i>	15,9 %	15,4 %

Lo stato di salute dei cittadini

l'abitudine al fumo

...'la situazione rimane stabile e ancora lontana dagli obiettivi del PSN'...

..."sebbene auspicabili e non ancora raggiunti, i livelli specifici segnalati dal PSN implicano importanti cambiamenti dei comportamenti dei cittadini: purtroppo tali comportamenti risultano ancora fortemente consolidati come modelli culturali”...

PSN 2001-2003

Il Consiglio dei Ministri il 7 febbraio 2001 ha approvato uno schema di decreto presidenziale per l'approvazione del PSN per il triennio 2001-2003 che sarà trasmesso ai pareri della conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari.

Gli **obiettivi** del Piano sono:

- riduzione della quantità giornaliera di sigarette fumate;
- incremento degli interventi di prevenzione e dei trattamenti di disassuefazione;
- riduzione della prevalenza di fumatori di età superiore ai 14 anni al 15% per gli uomini ed al 10% per le donne;
- riduzione, fino a zero, della frequenza delle donne che fumano durante la gravidanza;
- riduzione della prevalenza dei fumatori fra gli adolescenti

SPESA PER IL CONTROLLO DEL TABACCO IN ALCUNE NAZIONI, STATI O PROVINCIE (DOLLARI/PRO CAPITE)

U.S.A.	Massachusetts	6,50 (2000)
	California	3,31 (2000)
UNIONE EUROPEA	Gran Bretagna	0,89 (1999-2000)
	Francia	0,32
	Italia*	1€ (PSN 2001-3)
AUSTRALIA		0,48 (1997)
CANADA	Ontario	0,60 (2000-1)
	Colombia Britannica	1,11 (1999-2000)

BMJ vol. 321, 5 agosto 2000 (351-354)

*** spesa proposta da Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'ISS**

PIANO NAZIONALE TABAGISMO (2001-2010)

FINANZIAMENTO RICHIESTO £ 110 miliardi /ANNO

**110 MILIARDI = 1 EURO PER ABITANTE =
1936,27 X 57.600.000**

**110 MILIARDI CORRISPONDONO
ALLO 0,65% DELLE ENTRATE**

**Nel 1999 il gettito fiscale derivante dalla vendita di tabacchi
è stato di 16.870 MILIARDI**

**L'ultimo aumento concordato con i produttori
di £. 300 a pacchetto ha fruttato £. 225 allo Stato**

Osservatorio sul fumo

- 1. Epidemiologia del fenomeno**
- 2. Attivazione di un Telefono Verde**
- 3. Costituzione di una rete di centri per il trattamento della dipendenza**
- 4. Monitoraggio della comunicazione su giornali e televisione**
- 5. Valutazione delle evidenze disponibili sull'efficacia delle strategie di prevenzione e degli interventi di cessazione del fumo, verifica degli interventi in corso in Italia e monitoraggio delle azioni del progetto**
- 6. Coordinamento nazionale Ministero della Sanità (Dip. della Programmazione, Dip. della Prevenzione) e ISS per le iniziative da intraprendere nell'ambito della lotta al tabagismo**

800-554088

TELEFONO VERDE
CONTRO IL FUMO

Lunedì-Venerdì
10.00-16.00



Osservatorio su fumo, alcol e droga - Istituto Superiore di Sanità

TELEFONO VERDE CONTRO IL FUMO

Si basa sui principi e sulle tecniche del counselling vis a vis

- ha dato informazioni scientifiche corrette, aggiornate e personalizzate
- ha favorito, attraverso il colloquio, l'individuazione del reale problema dell'utente
- ha valutato insieme all'utente una gamma di soluzioni del problema evidenziato
- ha facilitato la persona in difficoltà ad attuare modifiche comportamentali e decisionali necessarie per la diminuzione del disagio e dell'ansia

Principali bisogni degli utenti

- Informazioni sulle strutture territoriali
- Informazioni di tipo medico sanitario e legislativo
- Sostegno psicologico


Osservatorio sul fumo

**COSTITUZIONE DI UNA RETE DI CENTRI PER
IL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA**


Informazione strutture territoriali

ZONE GEOGRAFICHE	N° Centri Antifumo Banca Dati	Distribuzione per Zone Geografiche
EMILIA ROMAGNA	19	
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	
VENETO	27	
TRENTINO ALTO ADIGE	2	
LIGURIA	5	
LOMBARDIA	21	
PIEMONTE	14	
VALLE D'AOSTA	0	
TOTALE NORD		95
LAZIO	10	
TOSCANA	16	
MARCHE	4	
UMBRIA	2	
TOTALE CENTRO		32
ABRUZZO	2	
BASILICATA	1	
CALABRIA	5	
CAMPANIA	6	
MOLISE		
PUGLIA	13	
TOTALE SUD		27
SARDEGNA	1	
SICILIA	6	
TOTALE ISOLE		7
Tot. Centri Antifumo	161	161


Distribuzione Centri Antifumo Nord



Distribuzione Centri Antifumo Centro



Distribuzione Centri Antifumo Sud e Isole



Osservatorio sul fumo

**MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE
SU GIORNALI E TELEVISIONE**

Progetto fumo e TV

in collaborazione con RGB Medical -Milano

Periodo di monitoraggio	1 maggio 2000-31 aprile 2001
Reti monitorate	RAI, Mediaset, TMC per un totale di 7 canali
Genere monitorato	tutte le Fiction e tutti i Film
Fascia oraria di monitoraggio	11.30 - 23.30
Totale ore monitorate	965
Atti fumo	2.202
Frequenza atti fumo	1 ogni 26 minuti

Osservatorio su fumo, alcol e droga - Istituto Superiore di Sanità

Osservatorio sul fumo

**VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE DISPONIBILI
SULL'EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI
PREVENZIONE E DEGLI INTERVENTI DI
CESSAZIONE DEL FUMO, VERIFICA DEGLI
INTERVENTI IN CORSO IN ITALIA E
MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEL PROGETTO**

Sintesi delle revisioni sistematiche sulla efficacia degli interventi di cessazione del fumo rivolti alla popolazione generale

M. Davoli, S. Minozzi

Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell'abitudine al fumo

*P. Zuccaro, M. Davoli, S. Minozzi, G. Caraffa, FM. Corti, D. Enea, V.
Fogliani, E. Malvezzi, S. Nardini, R. Pacifici, D. Vanuzzo*

In un articolo pubblicato su
LANCET (1985), 1: 918-920


Il Dott. Chapman sostiene che i programmi antifumo non sempre raggiungono effetti desiderati mentre ogni medico potrebbe convincere 25 pazienti l'anno a smettere di fumare e per la GB potrebbero essere 500.000 ogni anno.

...

Non esiste un programma ottimale per smettere. Le terapie basate su avversione, ipnosi, agopuntura, nicorette, hanno tutte qualche pregio ma nessun approccio antifumo è *migliore*.

Vendite di farmaci antifumo in Italia

(valori x 1000) - Anni 1998-2000



Lo stato del rimborso delle terapie antifumo nei differenti paesi

Paese	Bupropione	NRT
UK e Irlanda	Totalmente rimborsato	Totalmente rimborsato
USA	Parzialmente rimborsato, Il generico, wellbutrin, totalmente rimborsato Da HMOs e Medicare	Rimborso da poche e non significative HMOs
Germania	Rimborso in piani di assicurazione privati, no rimborso pubblico	Rimborso in piani di assicurazione privati, no rimborso pubblico
Olanda, Spagna, Norvegia, Polonia, Nuova Zelanda, Belgio, Svezia, Austria	Presentata la richiesta di rimborso	Mai presentata la richiesta di rimborso
Italia	Presentata richiesta inserimento fascia A = rifiutata	Mai presentata la richiesta di rimborso

M.G. Marini, Cap Gemini Ernst & Young, Lotta contro il fumo

ISS 9/3/01

Progetto Tabagismo

ELENCO UNITA' OPERATIVE

- Studio delle modalità di assunzione del fumo di sigaretta e quantizzazione dei livelli di esposizione al fumo passivo - **R. Pacifici**
- Analisi mutagenetica del condensato del *mainstream smoke* delle sigarette e valutazione dei danni indotti *in vivo* nel DNA dei soggetti fumatori - **R. Crebelli**
- Livelli di idrocarburi policiclici aromatici e di ammine aromatiche nelle sigarette italiane e loro effetti sugli addotti aromatici ad DNA linfocitario - **P. Dolaro**
- Monitoraggio epidemiologico dei danni da fumo nelle donne - **C. La Vecchia**
- Fumo, rischio di demenza e malattia di Alzheimer - **S. Giampaoli**
- Valutazione dell'efficacia del supporto psicologico nei trattamenti farmacologici per la disassuefazione dal fumo ospedaliero - **M. Davoli**

*Ministero della Sanità - Programmi per la ricerca finalizzata 2001
(art. 12 DLgs 502/92)*