

TOBACCO AND POVERTY A VICIOUS CIRCLE

VI Convegno Nazionale Tabagismo e SSN

Relazione annuale sul fumo in Italia

Roberta Pacifici

Osservatorio Fumo Alcol e Droga
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

31 maggio 2004




WORLD NO TOBACCO DAY - 31 MAY




© World Health Organization - 2004. All rights reserved. Design: www.who.int

Produzione di tabacco in alcuni Paesi rispetto alla produzione mondiale (anno 2003): valori percentuali



Elaborazione OSSFAD-ISS su dati FAO

Produzione di tabacco nell'UE negli anni 1961-2003



* Fino al 1999 Belgio-Lussemburgo

Elaborazione OSSFAD-ISS su dati FAO

Unione Europea: importazione ed esportazione di tabacco (anno 2002)


Importazione di tabacco

		tonnellate	%
1	GERMANIA	182.274	26,3
2	PAESI BASSI	101.570	14,6
3	FRANCIA	87.852	12,7
4	REGNO UNITO	67.431	9,7
5	BELGIO	65.460	9,4
6	ITALIA	43.040	6,2
7	SPAGNA	36.950	5,3
8	AUSTRIA	24.596	3,5
9	GRECIA	23.987	3,5
10	DANIMARCA	15.916	2,3
11	IRLANDA	12.253	1,8
12	SVEZIA	11.073	1,6
13	PORTOGALLO	11.012	1,6
14	LUSSEMBURGO	8.042	1,2
15	FINLANDIA	2.570	0,4
	UE	640.030	100,0

Esportazione di tabacco


		tonnellate	%
1	ITALIA	119.165	29,6
2	GRECIA	84.124	20,9
3	GERMANIA	59.899	14,9
4	BELGIO	48.357	12,0
5	SPAGNA	30.221	7,5
6	FRANCIA	23.429	5,8
7	PAESI BASSI	15.179	3,8
8	REGNO UNITO	11.842	2,9
9	PORTOGALLO	6.343	1,6
10	SVEZIA	2.067	0,5
11	DANIMARCA	1.193	0,3
12	AUSTRIA	1.030	0,3
13	FINLANDIA	160	0,0
14	LUSSEMBURGO	127	0,0
15	IRLANDA	61	0,0
	UE	403.197	100,0

Vendite di sigarette nel decennio 1993-2003



Var. 2003/2002

-1,3%




1.350 tonnellate in meno vendute



67.500.000 pacchetti da 20 sigarette
(Il kg convenzionale equivale a 1.000 sigarette)

Elaborazione OSSFAD-ISS su dati Monopoli di Stato (2003)

Vendite di sigarette nazionali ed estere negli anni 1993-2003



Elaborazione OSSFAD-ISS su dati Monopoli di Stato (2003)


MARCHE DI SIGARETTE PIU' VENDUTE

MARCA

CONFEZIONE

1	MARLBORO KS	astuccio da 20 pezzi
2	MARLBORO GOLD KS	astuccio da 20 pezzi
3	MS F	cartoccio da 20 pezzi
4	DIANA ROSSA KS	astuccio da 20 pezzi
5	MERIT GIALLA	astuccio da 20 pezzi
6	DIANA BLU KS	astuccio da 20 pezzi
7	MS F	astuccio da 20 pezzi
8	PALL MALL BLUE KS 20'S	astuccio da 20 pezzi
9	CAMEL SUBTLE FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi
10	PALL MALL RED KS 20'S	astuccio da 20 pezzi

Vendite di sigarette per fascia di condensato negli anni 1995-2003 (valori percentuali)




Elaborazione OSSFAD-ISS su dati Monopoli di Stato (2003)

Il peso dei vari canali distributivi


(sugli acquisti di sigarette effettuati negli ultimi 30 giorni)

Anno 2004



Il peso dei distributori automatici aumenta fra i giovani di 15-24 anni (13,7%).

Contrabbando tabacchi lavorati esteri dal 1993 al 2003



	Var. '03/'93	Var. '03/'02
Sequestri	- 77,6	- 8,9
Consumati in frode	- 84,4	- 93,1

Elaborazione OSSFAD-ISS su dati Comando Generale della GdF (2003)

Il fumo in Italia: lo scenario attuale

**Indagine DOXA effettuata per conto de
l'Istituto Superiore di Sanità,
in collaborazione con
l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori**

Metodo dell'indagine

Per questa indagine sono state condotte **3.050** interviste ad un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta di 15 anni ed oltre.


La rilevazione è stata effettuata col sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) da 139 intervistatori opportunamente istruiti e controllati.

Le interviste sono state realizzate nel periodo **marzo-aprile 2004** in **122** comuni di tutte le regioni italiane.

I PRINCIPALI RISULTATI

OSSFAD, Istituto Superiore di Sanità – Indagine DOXA 2004

Distribuzione percentuale del campione per sesso ed abitudine al fumo (anno 2004)




Gli italiani secondo l'abitudine al fumo


(stima su dati Doxa 2004)

	Totale	Maschi	Femmine
FUMATORI	12,8 milioni circa (26,2%)	7,1 milioni circa (30,0%)	5,7 milioni circa (22,5%)
EX-FUMATORI	8,6 milioni circa (17,9%)	5,8 milioni circa (24,8%)	2,8 milioni circa (11,2%)
NON FUMATORI	27,4 milioni circa (55,9%)	10,6 milioni circa (45,2%)	16,8 milioni circa (66,3%)


Prevalenza dei fumatori per sesso e classe d'età: valori percentuali (anno 2004)



Prevalenza dei fumatori secondo il sesso e l'area geografica: valori percentuali (anno 2004)



Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA condotte tra il 1957 ed il 2004




—◆— maschi


—■— femmine

—▲— totale

Variazione percentuale dei fumatori 2004/2003 per sesso e classe d'età



Consumo medio giornaliero secondo le indagini Doxa condotte fra il 1957 e il 2004



Età media a cui si inizia a fumare

Maschi
16,8

Femmine
18,2

Totale
17,3

I tentativi di smettere

Tentativi di smettere
con successo



2004

17,9%

2003

16,6%

del campione (ex fumatori)

circa 700.000 fumatori hanno smesso nell'ultimo anno

I tentativi di smettere senza successo

	2004	2003	
Almeno un tentativo di smettere	41,6%	40,6%	fra gli attuali fumatori

	2004	2003
■ Smesso solo per qualche anno	19,3%	20,1%
■ Smesso solo per qualche mese	31,8%	29,5%
■ Ridotto il consumo e ora fumano meno	6,4%	5,1%
■ Smesso solo per qualche settimana	11,6%	14,5%
■ Smesso solo per qualche giorno	20,4%	17,3%
■ Ridotto il consumo ma solo temporaneamente	6,0%	8,1%
➤ Nessun risultato	4,5%	5,4%

I tentativi di smettere: si cerca di più il supporto psicologico o farmacologico?

Tentativi senza successo

	2004	2003
▪ nessun tipo di supporto	87,1%	90,1%
▪ solo supporto farmacologico	6,7%	6,8%
▪ solo supporto psicologico	4,6%	1,8%
▪ sia psicologico che farmacologico	1,6%	1,3%

Tentativi con successo

❖ nessun tipo di supporto	90,4%	85,5%
❖ credono di non essere mai stati “veri” fumatori	4,8%	11,2%
❖ solo supporto farmacologico	2,1%	0,8%
❖ solo supporto psicologico	1,9%	1,6%
❖ sia psicologico che farmacologico	0,8%	0,8%

I medici di base

Al **23,1% dei fumatori** è capitato nel corso degli ultimi 12 mesi che il proprio medico suggerisse spontaneamente di smettere di fumare

Lei sa se il suo medico fuma?

- sicuramente sì 11.4%
- credo di sì 6.9%
- credo di no 17.0%
- sicuramente no 35.4%
- non so 29.2%




almeno il 18,3% crede che il proprio medico fumi

I POSSIBILI EFFETTI DEL FUMO SUL GUSTO

(secondo le opinioni dei fumatori)

Secondo Lei il fumo di sigaretta ha degli effetti sul gusto?




Il 54,5% dei fumatori ritiene che il fumo alteri il gusto

I POSSIBILI EFFETTI DEL FUMO SUL GUSTO

(secondo le opinioni dei fumatori)

Secondo Lei, dopo 2-3 giorni senza fumare, migliorano le capacità di apprezzare il gusto dei cibi?



Il 45% dei fumatori è consapevole della possibilità di apprezzare maggiormente i cibi dopo solo 2-3 giorni

Riferimenti Normativi anno 2003

- **LEGGE 16 gennaio 2003, n.3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (GU n. 15 del 20-1-2003 - Supplemento Ordinario n.5)**

- **Legge 31 ottobre 2003, n.306. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Ordinario n. 173)**

Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2003

Art. 7


(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003, Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori». (G. U. n.300 del 29/12/2003) comunitaria 2003 (G.U. n.266 del 15-11-2003 – Suppl.**

Entrata in vigore: 29 Dicembre 2004

I DIVIETI DI FUMARE:


favorevole o contrario alla creazione di spazi per fumatori nei locali pubblici e al divieto di fumare al di fuori di essi?



L' 86,8% dei fumatori è favorevole

I DIVIETI DI FUMARE:

favorevole o contrario al fatto che il divieto di fumare sul **posto di lavoro** (se non in appositi spazi) venga esteso a tutte le aziende?



L' 85,8% dei fumatori è favorevole

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 184

“Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.”
(*G.U. n. 169 del 23-07- 2003*)

Entrata in vigore: 24 Luglio 2003

Scritte maggiormente ricordate sui pacchetti di sigarette

"Il fumo uccide"



82,9% dei fumatori

"Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno"




47,6% dei fumatori

"Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni"



43,9% dei fumatori

Scritte in cui si registra una maggiore differenza tra uomini e donne




La scritta che ha colpito di più:

"Il fumo uccide" → 46,9% dei fumatori

La scritta che ha colpito meno:

"Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare" → 0,3% dei fumatori



EFFETTI DELLE SCRITTE SUI FUMATORI



circa 1.200.000 fumatori hanno ridotto il numero di sigarette fumate

Un forte aumento dei prezzi delle sigarette potrebbe contribuire a ridurre la diffusione del fumo tra i giovani?

- molto/abbastanza
- poco/per nulla
- non so



Telefono Verde contro il Fumo

800 554088

Lunedì – Venerdì 10.00–16.00


Anonimo e Gratuito

Osservatorio Fumo, Alcol e Droga - Istituto Superiore di Sanità

Il Telefono Verde (TVF) dell'Istituto Superiore di Sanità

Fumatori che conoscono il numero verde dell'ISS	2003	2004	Var. 04/'03
	33,7 %	38,1 %	+4,4%

Telefonate totali al TVF negli anni 2001-2004



* stima 2004

■ = gennaio - aprile

■ = maggio - dicembre

SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO

**Collaborazione: Ministero della Salute –
Coordinamento tecnico delle Regioni sul tabagismo -
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (ISS):**

**RILEVARE E DISPORRE DI DATI OMOGENEI E COMPARABILI
TRA LORO SIA IN AMBITO REGIONALE CHE NAZIONALE PER LO
SVILUPPO DI STRATEGIE DI INTERVENTO GLOBALI,
COORDINATE ED EFFICACI**

SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO

Aggiornamento al 30 Aprile 2004

Centri antifumo censiti nel 2004 = 345

- **Ospedali, ASL = 265**
- **Centri Lega Tumori = 80**

Centri antifumo censiti nel 2003 = 330


- Ospedali, ASL = 251
- Centri Lega Tumori = 79

Centri antifumo censiti nel 2002 = 274

- Ospedali, ASL = 195
- Centri Lega Tumori = 79

Bacino di utenza: 1 centro per 43.000 fumatori
OSSFAD - Istituto Superiore di Sanità

Distribuzione Regionale dei Servizi per la Cessazione 2004



REGIONI	CENTRI SSN*	CENTRI LILT**	TOTALE CENTRI 2004	%
EMILIA ROMAGNA	33	6	39	11,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	6	2	8	2,3
VENETO	29	7	36	10,4
TRENTINO ALTO ADIGE	10	1	11	3,1
LIGURIA	8	4	12	3,5
LOMBARDIA	37	7	44	13
PIEMONTE	17	5	22	6,3
VALLE D'AOSTA	1	1	2	0,6
TOTALE NORD	141	33	174	50,5
LAZIO	16	5	21	6,1
TOSCANA	27	8	35	10,1
MARCHE	10	4	14	4,1
UMBRIA	9	2	11	3,2
TOTALE CENTRO	62	19	81	23,5
ABRUZZO	6	1	7	2
BASILICATA	1	1	2	0,6
CALABRIA	13	4	17	5
CAMPANIA	11	5	16	4,6
MOLISE	2	2	4	1,1
PUGLIA	17	5	22	6,3
SARDEGNA	4	4	8	2,3
SICILIA	8	6	14	4,1
TOTALE SUD e ISOLE	62	28	90	26
TOT. CENTRI	265	80	345	100

* Centri di Ospedali, ASL

** Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)

Regione

Azienda USL

Centro Antifumo "..... Senza Fumo"

Via del Mare, 3

00000 - Roma

Referente/i:

Dr. Mario Rossi

Tel.: 000/000000

Fax: 000/000000

E-mail: abcdefg@abcdefg.it

Contatto Telefonico:

Lun., Mar., Gio., Ven. ore 8.00/14.00

Contatto Diretto presso il Servizio:

Lun., Mar., Gio., Ven. ore 8.00/14.00

Équipe: Medico, Psicologo, Infermiere,

Operatore Centro

Antifumo

Tipologia dell'Intervento:

Valutazione Clinico-Funzionale:

Esami del Respiro, Esami Strumentali

Terapia Farmacologica:

sì no

Counselling Individuale:

- ✓ più di 10 incontri della durata di 30 minuti
- ✓ 1 volta/settimana

Terapia di Gruppo:

- ✓ incontri della durata di 120 minuti

Altre Terapie/Interventi:


- ✓ Ipnoterapia
- ✓ più di 10 incontri

Prestazioni soggette:

- a ticket
- a pagamento
- gratuito

Anno di Attivazione: 2003


Tipologia di Struttura che accoglie il Servizio



Servizi Territoriali: Asl, Poliambulatori, ...;
Servizi ospedalieri: A.O.;P.O.;IRCCS;...;
Altro: altre tipologie di strutture


Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità
Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Collocazione del servizio di cessazione



Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità
Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga


Modalità di accesso al servizio



***Nel 51% dei casi l'accesso avviene tramite richiesta di un professionista sanitario**

**Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità
Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga**


Percentuale di presenza nei Servizi di Cessazione delle diverse figure professionali



Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità


Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Medico




Attività svolta nell'orario di lavoro


Formazione Specifica




Attività svolta nell'orario di lavoro



Formazione Specifica




Infermiere




Attività svolta nell'orario di lavoro

Formazione Specifica



Tipologie di Interventi previste nei Servizi di Cessazione



a-b=Valutazione clinico-funzionale e diagnostica
c=Terapia Farmacologica
d=Counselling Individuale


e=Terapia di Gruppo
f=Terapia Non Convenzionale
g=Altri interventi

Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo


Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità

Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Terapia Non Convenzionale




Tipologia di Terapie Non Convenzionali




*Auricoloterapia; Acutedox; Omeopatia; Fitoterapia

Utenti Seguiti nel 2001/2002




Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità
Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Modalità di Pagamento dell'intero intervento di cessazione




Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità
Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

TRATTAMENTO COMPLESSIVO: modalità di pagamento



Distribuzione dei trattamenti complessivi secondo gli importi in euro rilevati:
valori percentuali



Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità
Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Studio longitudinale di valutazione dell'efficacia nella pratica degli interventi per la cessazione dell'abitudine al fumo

Maggio 2003 - Aprile 2004	N°	
Centri che hanno aderito	66	
Centri non rispondenti	24	
Centri che hanno inviato il materiale	42	
Nord Italia	7	
Centro Italia	25	
Sud Italia e isole	10	
Utenti contattati	1979	
Arruolati	1554	78.5%
Rifiuti	425	21.5%



Caratteristiche degli interventi

Analisi preliminare (575 interventi su 360 utenti)

	n° utenti	%
N° interventi per utente		
1	188	52,2
2	130	36,1
>2	42	11,7
Frequenza dei tipi di intervento		
Counselling individuale	194	33,7
Terapia di gruppo	170	29,6
Terapia Bupropione	41	7,1
Inalatori/cerotti	70	12,2
Altri interventi	100	17,4
Esito degli interventi		
Completati	413	71,8
Interrotti	135	23,5
n.r	27	4,7

Abitudine al fumo

Età media di inizio fumo	17 anni
media della durata dell'abitudine al fumo	28 anni
media sigarette fumate	24
n° utenti che hanno tentato di smettere di fumare	338
	66.80%
n° medio di tentativi per smettere	2
n° utenti che hanno tentato di smettere da soli	275
	54.35%
media del periodo più lungo di astensione	17 mesi

U.L.	11
altro	57
autostima	88
altri problemi di salute	104
problemi salute respiratoria	132
timore di future malattie	122
accesso al Centro	
Motivo principale di	n. utenti



Dipartimento del
Farmaco



Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Istituto di Fisiologia
Céntica - Pisa



Dipartimento di
Epidemiologia ASL RME

Fumo e patologie respiratorie

Le carte del rischio

per Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva e Tumore al polmone

Osservatorio Fumo Alcol e Droga

Responsabile: Piergiorgio Zuccaro

Responsabile settore fumo: Roberta Pacifici

Gruppo di lavoro: Antonella Bacosi, Giordano Carosi, Simonetta Di Carlo, Alessandra Di Pucchio, Emilia Marchei, Laura Martucci, Donatella Mattioli, Monica Mazzola, Gabriele Modigliani, Claudia Mortali, Ilaria Palmi, Manuela Pellegrini, Simona, Pichini, Enrica Pizzi, Rosaria Russo, Silvia Rossi