

METAQUALONE

[41] TRATTAMENTI PER LA DIPENDENZA DA METAQUALONE NEGLI ADULTI

McCarthy G, Myers B, Siegfried N. Data della prima pubblicazione CLIB 2, 2005

Plain language summary

La dipendenza e l'abuso di metaqualone (Mandrax), un ipnotico-sedativo, rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica in alcune regioni dell'Africa e dell'India.

I trattamenti adottati sono molto vari e vengono offerti sia ambulatorialmente che con ricoveri in ospedale. Nonostante un'accurata e vasta ricerca dei database elettronici, dei siti internet, degli atti dei Congressi e nonostante siano stati contattati i più esperti ricercatori in questo campo, gli autori non hanno trovato nessuno studio sperimentale sull'efficacia dei trattamenti per la dipendenza o l'abuso di Mandrax. Non vi sono evidenze disponibili per determinare quale sia il miglior modo di trattare la dipendenza da Mandrax negli adulti.

Obiettivi: Valutare l'efficacia di qualsiasi trattamento farmacologico o comportamentale sia ambulatoriale che residenziale paragonato con il placebo, altre forme di trattamento o nessun trattamento per la dipendenza da metaqualone.

Strategia di ricerca: Il registro specializzato del Gruppo Cochrane Droghe ed Alcol fino a Febbraio 2004; Il Registro Cochrane dei trial controllati (CENTRAL, Cochrane Library, Issue 2, 2004); MEDLINE (OVID - Gennaio 1966 - Febbraio 2004), PsycInfo (OVID - Gennaio 1967 – Febbraio 2004). Riferimenti bibliografici degli articoli, atti di Conferenze, ricerche ampie su internet e contatti con esperti nel campo

Risultati: La ricerca in letteratura ed i contatti diretti con ricercatori, non hanno portato all'identificazione di alcuno studio.

Conclusioni: Ad oggi non è stato condotto alcun RCT sull'efficacia dei trattamenti per la dipendenza da metaqualone sebbene questo tipo di dipendenza sia molto frequente e rappresenti un serio problema sanitario in Paesi quali il Sud Africa, altri Paesi africani e l'India. Di conseguenza non è possibile stabilire quale sia il trattamento più efficace per il trattamento di questo tipo di dipendenza