



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

La mortalità in Italia nell'anno 1994

R. Capocaccia, G. Farchi, S. Barcherini, A. Verdecchia,
S. Mariotti, R. Scipione, G. Feola e V. Buratta

ISSN 1123-3117

Rapporti ISTISAN

98/12

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

La mortalità in Italia nell'anno 1994

**Riccardo Capocaccia (a), Gino Farchi (a), Sabrina Barcherini (a), Arduino Verdecchia (a),
Sergio Mariotti (a), Riccardo Scipione (a), Giuseppe Feola (b) e Vittoria Buratta (c)**

(a) Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Superiore di Sanità

(b) Servizio di Statistiche Demografiche, Istituto Nazionale di Statistica

(c) già Servizio di Statistiche Demografiche, Istituto Nazionale di Statistica

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

La mortalità in Italia nel 1994.

Riccardo Capocaccia, Gino Farchi, Sabrina Barcherini, Arduino Verdecchia, Sergio Mariotti, Riccardo Scipione, Giuseppe Feola e Vittoria Buratta
1998, ii, 60 p. Rapporti ISTISAN 98/12

Viene presentata una serie di tabelle analitiche relative alla mortalità in Italia nell'anno 1994. Vengono riportati: i tassi specifici per età e per sesso relativi a tutta l'Italia, per 45 cause di morte; il tasso nazionale standardizzato alla popolazione del 1971; i tassi standardizzati di ciascuna regione e delle tre ripartizioni geografiche: nord, centro, sud/isole. Il rapporto fa parte di una serie che descrive, con metodologia invariata, la mortalità a partire dal 1970.

Parole chiave: Statistiche demografiche

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

Mortality in Italy in 1994.

Riccardo Capocaccia, Gino Farchi, Sabrina Barcherini, Arduino Verdecchia, Sergio Mariotti, Riccardo Scipione, Giuseppe Feola and Vittoria Buratta
1998, ii, 60 p. Rapporti ISTISAN 98/12 (in Italian)

A series of analytical tables for mortality data in Italy in 1994 is presented. The age- and sex-specific rates for the whole of Italy are reported for 45 different death causes, as well as the national standardised rate referred to 1971 population. The standardised rates for each of the 20 regions and the three main subdivisions: North, Center, South/Islands are also reported. This report belongs to a series describing mortality in Italy since 1970, using the same methods, with yearly up-dating editions.

Key words: Demographic statistics

INDICE

<i>Introduzione</i>	pag.	1
Caratteristiche generali: quadro riassuntivo		5
Mortalità generale (0-74 anni)		6
Mortalità generale (<1 anno)		7
Mortalità generale (25-44 anni)		8
Mortalità generale (45-64 anni)		9
Mortalità generale (65-74 anni)		10
Mortalità generale (>74 anni)		11
Mortalità generale (tutte le età)		12
Malattie infettive e parassitarie		13
Malattie infettive intestinali		14
Tubercolosi		15
- Tumori -		16
Tumori maligni - stomaco		17
Tumori maligni - colon		18
Tumori maligni - retto, giunzione rectosigmoidea, ano		19
Tumori maligni - trachea, bronchi, polmoni		20
Tumori maligni - mammella		21
Tumori maligni - utero		22
Leucemia		23
Diabete mellito		24
Anemia		25
Disturbi psichici		26
Malattie del sistema nervoso		27
- Malattie del sistema circolatorio -		28
Cardiopatie reumatiche croniche		29
Ipertensione		30
Malattie ischemiche del cuore		31
Infarto acuto del miocardio		32
Malattie cerebrovascolari		33
Arteriosclerosi		34
Malattie dell'apparato respiratorio		35
Polmonite		36
Influenza		37
Bronchite, enfisema ed asma		38
■ Malattie dell'apparato digerente		39
Ulcera dello stomaco e del duodeno		40

Ernia addominale	41
Cirrosi epatica	42
Colelitiasi	43
Malattie dell'apparato genito-urinario	44
Nefrite, nefrosi	45
Iperplasia della prostata	46
Complicazioni del 1a gravidanza, del parto e del puerperio	47
Malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo	48
Malformazioni congenite	49
Alcune cause di mortalità perinatale	50
Sintomi e stati morbosi mal definiti	51
Accidenti, avvelenamenti e traumatismi	52
Fratture	53
Traumatismi intracranici ed interni	54
Ustioni	55
Avvelenamenti ed effetti tossici	56
Appendice. Numero assoluto di decessi del 1994 per le cause considerate	57

INTRODUZIONE

Questo volume contiene una analisi descrittiva della mortalità per causa in Italia nell'anno 1994. Esso costituisce l'aggiornamento del volume "La mortalità in Italia nel periodo 1970-79" (1) e dei successivi aggiornamenti annuali (2). Esso riporta per 45 cause di morte i tassi specifici per età e sesso relativi a tutta l'Italia, il tasso standardizzato nazionale, i tassi standardizzati di ciascuna regione e di tre ripartizioni geografiche, Nord, Centro e Sud-Isole.

La descrizione del materiale usato e dei metodi di analisi impiegati sono descritti nel volume già citato al quale pertanto è opportuno riferirsi. In questo testo si ritiene sufficiente richiamare brevemente alcune di queste caratteristiche.

Fonte dei dati.- I dati di mortalità sono rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica per mezzo della scheda individuale di morte. Si riferiscono all'anno 1994 e sono da considerarsi definitivi.

Cause di morte.- Le cause di morte considerate coincidono con quelle analizzate nei volumi precedenti che a loro volta corrispondono in gran parte a quelle suggerite dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Il codice di morte riportato in ciascuna pagina fa riferimento alla IX Classificazione Internazionale delle Malattie e delle Cause di Morte (3). Questa è l'unica differenza sostanziale rispetto al primo volume che faceva riferimento alla VIII Classificazione. Si sottolinea comunque che questo unico cambiamento riguarda la codifica e non le cause considerate.

Suddivisione per età e sesso.- L'intervallo di età considerato è 0-74 anni compiuti, la suddivisione in classi di età è normalmente quinquennale. Le uniche eccezioni riguardano la classe di età 0-4 anni che talora viene ulteriormente suddivisa- per evidenziare, quando ciò è necessario, la quota di mortalità infantile.

Popolazione.- La popolazione media nel 1994, distribuita per età, sesso e regione di residenza, è stata ottenuta aggregando delle stime della popolazione provinciale, calcolate presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto Superiore di Sanità. Il metodo di stima utilizzato è descritto dettagliatamente altrove (4-6) ed è analogo a quello utilizzato nei precedenti rapporti. Esso si basa sull'aggiornamento delle distribuzioni relative al 1991 per mezzo dei dati sulla natalità, suddivisi per sesso e

provincia, sulla mortalità e sui movimenti anagrafici, suddivisi per età, sesso e provincia.

Tassi.- Per ogni causa sono stati calcolati i tassi nazionali specifici per età e sesso ed i loro errori standard. I tassi standardizzati sono calcolati avendo come riferimento la popolazione rilevata in Italia al censimento del 1971. La popolazione di riferimento è pertanto la stessa già utilizzata nei precedenti volumi. I tassi sono per 10.000.

Bibliografia

1. Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Morganti P., Panichelli Fucci M.L.: La mortalità in Italia nel periodo 1970-79 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1984 (Rapporti ISTISAN; n. 84/10)
2. Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Morganti P., Panichelli Fucci M.L.: La mortalità in Italia nell'anno 1980 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1985 (Rapporti ISTISAN; n. 85/10)
- Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Morganti P., Panichelli Fucci M.L.: La mortalità in Italia nell'anno 1981 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1986 (Rapporti ISTISAN; n. 86/42)
- Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Morganti P., Panichelli Fucci M.L.: La mortalità in Italia nell'anno 1982 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1987 (Rapporti ISTISAN; n. 87/53)
- Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Morganti P., Panichelli Fucci M.L.: La mortalità in Italia nell'anno 1983 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1987 (Rapporti ISTISAN; n. 87/54)
- Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Feola G., Morganti P.: La mortalità in Italia nell'anno 1984 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1989 (Rapporti ISTISAN; n. 89/5)
- Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Feola G., Morganti P.: La mortalità in Italia nell'anno 1985 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1989 (Rapporti ISTISAN; n. 89/6)
- Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Feola G., Morganti P.: La mortalità in Italia nell'anno 1986 Istituto Superiore di Sanità, Roma (Rapporti ISTISAN; n. 90/17)
- Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Feola G., Morganti P.: La mortalità in Italia nell'anno 1987 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1990 (Rapporti ISTISAN; n. 90/18)
- Capocaccia R., Farchi G., Prati S., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Feola G., Morganti P.: La mortalità in Italia nell'anno 1988 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1991 (Rapporti ISTISAN; n. 91/37)

- Capocaccia R., Farchi G., Prati S., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Feola G., Morganti P.: La mortalità in Italia nell'anno 1989 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1993 (Rapporti ISTISAN; n. 92/22)

- Capocaccia R., Farchi G., Prati S., Mariotti S., Verdecchia A., Angeli A., Scipione R., Feola G., Morganti P.: La mortalità in Italia nell'anno 1990 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1993 (Rapporti ISTISAN; n. 93/23)

- Capocaccia R., Farchi G., Mariotti S., Verdecchia A., Galletti A., Angeli A., Scipione R., Feola G., Cariani G.: La mortalità in Italia nell'anno 1991 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1995 (Rapporti ISTISAN; n. 95/34)

- Capocaccia R., Farchi G., Barcherini S., Verdecchia A., Mariotti S., Scipione R., Feola G., Cariani G.: La mortalità in Italia nell'anno 1992 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1997 (Rapporti ISTISAN; n. 97/32)

- Capocaccia R., Farchi G., Barcherini S., Verdecchia A., Mariotti S., Scipione R., Feola G., Cariani G.: La mortalità in Italia nell'anno 1993 Istituto Superiore di Sanità, Roma 1997 (Rapporti ISTISAN; n. 97/33)

3. Classificazione delle malattie, traumatismi e cause di morte, IX revisione, 1975. Metodi e norme, serie C n. 10, ISTAT, 1984.

4. Capocaccia R., Scipione R.: Stima della popolazione italiana per età, sesso e provincia di residenza negli anni 1971-79. *Epidemiologia e Prevenzione*, 21-22, 1984.

5. Capocaccia R., Caselli G.: Popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1972-1981. Università degli Studi di Roma, Dipartimento di Scienze Demografiche, Roma 1990 (Fonti e Strumenti).

6. Istituto Nazionale di Statistica, Istituto Superiore di Sanità: Ricostruzione della popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1982-1991. *Speciale Informazioni*, n.17 - 1996.

CARATTERISTICHE GENERALI : QUADRO RIASSUNTIVO

Fonte dei dati:	ISTAT - STATISTICHE DI MORTALITÀ' PER CAUSA
- Periodo considerato:	1994
- Cause di morte:	CODIFICATE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE (ICD), IX REVISIONE - 1975
- Fattore di scala dei tassi:	1/10.000
- Tassi standardizzati:	INTERVALLO DI ETÀ 0-74 ANNI
- Popolazione di riferimento:	ITALIA - CENSIMENTO 1971

MORTALITA' GENERALE**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETA'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	76.6	1.70	62.1	1.59
1-4	3.1	0.16	3.2	0.17
5-9	1.8	0.11	1.6	0.11
10-14	2.1	0.12	1.4	0.10
15-19	7.5	0.20	2.4	0.11
20-24	9.2	0.20	2.7	0.11
25-29	11.2	0.22	4.4	0.14
30-34	16.7	0.27	5.9	0.16
35-39	16.5	0.29	7.2	0.19
40-44	20.8	0.33	10.3	0.23
45-49	31.0	0.40	17.3	0.30
50-54	54.5	0.56	26.8	0.39
55-59	88.3	0.71	41.1	0.47
60-64	151.6	0.95	66.4	0.61
65-69	249.8	1.27	110.9	0.80
70-74	390.6	1.72	199.0	1.10
TASSO STANDARDIZZATO	46.4	0.12	25.4	0.09

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	47.1	0.4	26.4	0.3
Val D'Aosta	55.4	2.9	26.2	2.0
Lombardia	50.6	0.3	25.3	0.2
Trentino Alto Adige	48.5	1.0	22.4	0.7
Veneto	48.7	0.4	23.7	0.3
Friuli Venezia Giulia	50.1	0.8	25.7	0.6
Liguria	47.5	0.7	26.1	0.5
Emilia Romagna	43.5	0.4	24.2	0.3
Toscana	42.8	0.5	22.9	0.3
Umbria	40.9	0.9	22.7	0.7
Marche	38.3	0.7	20.7	0.5
Lazio	45.2	0.4	25.3	0.3
Abruzzi	42.2	0.8	23.3	0.6
Molise	40.8	1.5	23.1	1.1
Campania	52.4	0.4	31.0	0.3
Puglia	42.3	0.5	25.0	0.4
Basilicata	40.6	1.1	25.0	0.9
Calabria	42.8	0.6	25.2	0.5
Sicilia	44.8	0.4	28.3	0.3
Sardegna	47.8	0.8	24.5	0.6
Nord	48.1	0.2	25.0	0.1
Centro	43.1	0.3	23.7	0.2
Sud e Isole	45.9	0.2	27.2	0.2

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

**MORTALITA' GENERALE
(MENO DI UN ANNO DI ETA')**
1994
TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	60.0	6.2	53.4	6.0
Val D'Aosta	88.5	44.1	23.4	23.3
Lombardia	58.8	4.1	47.9	3.8
Trentino Alto Adige	53.2	10.8	52.8	11.0
Veneto	63.9	6.0	40.8	4.9
Friuli Venezia Giulia	33.4	9.2	37.9	10.1
Liguria	60.4	10.8	62.6	11.4
Emilia Romagna	62.6	6.9	56.5	6.8
Toscana	73.2	7.8	48.5	6.5
Umbria	57.1	13.8	46.6	12.9
Marche	73.6	11.6	69.0	11.6
Lazio	67.6	5.4	51.1	4.9
Abruzzi	89.3	12.6	93.2	13.3
Molise	99.9	25.7	42.6	17.4
Campania	102.7	5.3	82.8	5.0
Puglia	85.9	6.2	73.6	6.0
Basilicata	88.4	16.9	56.4	14.0
Calabria	88.1	8.8	82.1	8.8
Sicilia	95.9	5.7	81.2	5.4
Sardegna	75.5	10.2	29.8	6.7
Nord	59.4	2.5	49.1	2.3
Centro	69.2	4.0	52.3	3.6
Sud e Isole	93.6	2.8	76.6	2.6
ITALIA	76.6	1.7	62.1	1.6

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

MORTALITA' GENERALE
(ETA' 25 - 44 ANNI)
1994**TASSI STANDARDIZZATI**

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	16.5	0.5	7.9	0.4
Val D'Aosta	24.7	3.7	6.4	1.9
Lombardia	19.6	0.4	7.5	0.2
Trentino Alto Adige	15.3	1.1	6.3	0.7
Veneto	15.0	0.5	7.0	0.3
Friuli Venezia Giulia	15.1	0.9	7.6	0.7
Liguria	21.8	1.0	9.2	0.7
Emilia Romagna	17.5	0.6	7.6	0.4
Toscana	14.7	0.5	6.2	0.4
Umbria	13.3	1.1	6.8	0.8
Marche	12.6	0.8	5.9	0.5
Lazio	17.2	0.5	7.0	0.3
Abruzzi	12.8	0.9	6.6	0.6
Molise	11.1	1.6	4.9	1.1
Campania	15.4	0.4	6.3	0.3
Puglia	13.5	0.5	6.2	0.3
Basilicata	12.1	1.2	4.8	0.8
Calabria	13.9	0.7	6.8	0.5
Sicilia	14.9	0.5	6.9	0.3
Sardegna	21.7	0.9	7.3	0.5
Nord	17.7	0.2	7.6	0.1
Centro	15.5	0.3	6.6	0.2
Sud e Isole	15.0	0.2	6.5	0.2
ITALIA	16.3	0.1	7.0	0.1

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**MORTALITA' GENERALE
(ETA' 45 - 64 ANNI)**
1994
TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	81.5	1.2	39.5	0.8
Val D'Aosta	106.4	8.5	45.1	5.5
Lombardia	84.7	0.9	36.9	0.6
Trentino Alto Adige	82.9	2.9	33.8	1.8
Veneto	84.8	1.3	35.4	0.8
Friuli Venezia Giulia	91.7	2.5	40.0	1.6
Liguria	78.1	1.9	37.9	1.2
Emilia Romagna	71.2	1.2	34.7	0.8
Toscana	71.8	1.3	33.8	0.8
Umbria	69.5	2.6	33.5	1.7
Marche	59.4	1.8	29.4	1.3
Lazio	72.7	1.1	36.7	0.7
Abruzzi	70.4	2.2	32.6	1.5
Molise	76.3	4.5	31.2	2.8
Campania	91.1	1.3	45.7	0.9
Puglia	70.6	1.3	34.7	0.9
Basilicata	79.2	3.4	36.3	2.3
Calabria	73.8	1.8	36.6	1.3
Sicilia	74.5	1.2	39.5	0.8
Sardegna	79.5	2.1	34.4	1.4
Nord	81.9	0.5	36.9	0.3
Centro	70.4	0.7	34.5	0.5
Sud e Isole	78.3	0.6	38.8	0.4
ITALIA	78.4	0.3	37.0	0.2

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

MORTALITA' GENERALE
(ETA' 65 - 74 ANNI)
1994**TASSI STANDARDIZZATI**

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	304	3.8	149	2.4
Val D'Aosta	297	23.2	134	13.9
Lombardia	338	3.0	149	1.7
Trentino Alto Adige	325	9.3	128	5.0
Veneto	326	4.1	137	2.3
Friuli Venezia Giulia	336	7.5	150	4.2
Liguria	306	5.6	144	3.4
Emilia Romagna	281	3.6	135	2.2
Toscana	286	3.8	134	2.3
Umbria	270	7.5	132	4.8
Marche	267	5.8	118	3.5
Lazio	306	3.7	150	2.3
Abruzzi	282	6.6	133	4.1
Molise	242	12.0	143	8.3
Campania	351	4.2	190	2.7
Puglia	280	4.2	153	2.8
Basilicata	237	9.2	157	7.0
Calabria	278	5.7	145	3.8
Sicilia	296	3.8	174	2.6
Sardegna	289	6.8	151	4.5
Nord	316	1.6	144	1.0
Centro	290	2.3	138	1.4
Sud e Isole	300	1.9	165	1.3
ITALIA	305	1.1	149	0.7

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.
DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

MORTALITA' GENERALE
(ETA' > 74 ANNI)
1994**TASSI STANDARDIZZATI**

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	974	8.6	659	5.1
Val D'Aosta	997	54.5	584	30.7
Lombardia	983	7.1	626	3.8
Trentino Alto Adige	903	21.2	579	11.9
Veneto	958	9.5	595	5.2
Friuli Venezia Giulia	996	16.6	607	8.9
Liguria	956	12.2	620	7.0
Emilia Romagna	887	8.0	569	4.8
Toscana	891	8.4	620	5.3
Umbria	951	18.0	603	11.2
Marche	877	13.4	606	8.4
Lazio	941	8.7	655	5.5
Abruzzi	918	15.1	683	8.6
Molise	861	27.6	627	18.8
Campania	1033	10.0	783	6.7
Puglia	911	9.9	684	6.8
Basilicata	859	22.2	689	17.0
Calabria	868	12.7	674	9.1
Sicilia	971	8.5	804	6.3
Sardegna	863	14.2	666	10.3
Nord	954	3.7	612	2.1
Centro	912	5.3	629	3.3
Sud e Isole	936	4.3	726	3.1
ITALIA	937	2.5	646	1.5

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**MORTALITA' GENERALE
(TUTTE LE ETA')**
1994
TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	75.0	0.5	56.0	0.4
Val D'Aosta	84.0	3.3	52.0	2.4
Lombardia	78.5	0.4	53.5	0.3
Trentino Alto Adige	74.0	1.2	48.6	0.9
Veneto	75.9	0.5	50.5	0.4
Friuli Venezia Giulia	78.0	1.0	53.0	0.7
Liguria	75.0	0.8	54.0	0.6
Emilia Romagna	69.0	0.5	50.0	0.4
Toscana	68.0	0.5	51.0	0.4
Umbria	68.0	1.0	50.0	0.8
Marche	63.0	0.8	48.0	0.6
Lazio	72.0	0.5	54.9	0.4
Abruzzi	68.0	0.9	54.0	0.7
Molise	65.0	1.7	52.0	1.4
Campania	81.8	0.5	66.3	0.4
Puglia	68.3	0.5	56.0	0.5
Basilicata	65.1	1.3	56.2	1.2
Calabria	67.5	0.7	55.7	0.6
Sicilia	72.5	0.5	64.8	0.4
Sardegna	72.2	0.9	54.6	0.7
Nord	75.0	0.2	53.0	0.2
Centro	69.0	0.3	52.0	0.2
Sud e Isole	72.5	0.2	60.0	0.2
ITALIA	73.1	0.1	54.6	0.1

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

**MALATTIE INFETTIVE E
PARASSITARIE**
1994
TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ¹	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	0.82	0.18	0.38	0.13
1-4	0.07	0.02	0.10	0.03
5-9	0.04	0.02	0.02	0.01
10-14	0.01	0.01	0.02	0.01
15-19	0.04	0.01	0.00	0.01
20-24	0.02	0.01	0.01	0.01
25-29	0.05	0.02	0.04	0.01
30-34	0.16	0.03	0.04	0.01
35-39	0.12	0.02	0.06	0.02
40-44	0.15	0.03	0.07	0.02
45-49	0.20	0.03	0.09	0.02
50-54	0.26	0.04	0.15	0.03
55-59	0.44	0.05	0.16	0.03
60-64	0.63	0.06	0.27	0.04
65-69	1.14	0.09	0.50	0.05
70-74	1.74	0.13	0.90	0.08
TASSO STANDARDIZZATO	0.24	0.01	0.13	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.24	0.03	0.14	0.03
Val D'Aosta	0.44	0.26	0.14	0.14
Lombardia	0.20	0.02	0.13	0.02
Trentino Alto Adige	0.26	0.07	0.21	0.07
Veneto	0.29	0.04	0.07	0.02
Friuli Venezia Giulia	0.36	0.07	0.13	0.04
Liguria	0.21	0.05	0.11	0.03
Emilia Romagna	0.24	0.04	0.16	0.03
Toscana	0.23	0.03	0.16	0.03
Umbria	0.14	0.05	0.11	0.05
Marche	0.22	0.05	0.09	0.03
Lazio	0.28	0.03	0.15	0.02
Abruzzi	0.26	0.06	0.17	0.05
Molise	0.20	0.10	0.08	0.06
Campania	0.31	0.04	0.09	0.02
Puglia	0.23	0.03	0.11	0.02
Basilicata	0.16	0.07	0.21	0.09
Calabria	0.24	0.05	0.13	0.04
Sicilia	0.15	0.02	0.11	0.02
Sardegna	0.34	0.06	0.16	0.05
Nord	0.24	0.01	0.13	0.01
Centro	0.25	0.02	0.14	0.02
Sud e Isole	0.24	0.02	0.12	0.01

CAUSA: 000-139 ICD IX REV.
DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**MALATTIE INFETTIVE
INTESTINALI**
1994
TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	0.08	0.06	0.00	0.00
1-4	0.01	0.01	0.02	0.01
5-9	0.00	0.00	0.01	0.01
10-14	0.00	0.00	0.01	0.01
15-19	0.00	0.00	0.00	0.00
20-24	0.00	0.00	0.00	0.00
25-29	0.00	0.00	0.00	0.00
30-34	0.00	0.00	0.00	0.00
35-39	0.00	0.00	0.01	0.01
40-44	0.00	0.00	0.00	0.00
45-49	0.01	0.01	0.01	0.01
50-54	0.00	0.00	0.00	0.00
55-59	0.01	0.01	0.00	0.00
60-64	0.01	0.01	0.01	0.01
65-69	0.01	0.01	0.00	0.00
70-74	0.10	0.03	0.03	0.01
TASSO STANDARDIZZATO	0.01	0.00	0.01	0.00

CAUSA: 000-009 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

TUBERCOLOSI**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	0.00	0.00	0.01	0.01
5-9	0.01	0.01	0.00	0.00
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	0.01	0.01	0.01	0.01
20-24	0.00	0.00	0.00	0.00
25-29	0.00	0.00	0.01	0.01
30-34	0.06	0.02	0.00	0.00
35-39	0.03	0.01	0.02	0.01
40-44	0.04	0.02	0.02	0.01
45-49	0.07	0.02	0.01	0.01
50-54	0.10	0.02	0.04	0.02
55-59	0.17	0.03	0.03	0.01
60-64	0.27	0.04	0.06	0.02
65-69	0.53	0.06	0.21	0.04
70-74	0.96	0.09	0.26	0.04
TASSO STANDARDIZZATO	0.09	0.01	0.03	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.10	0.02	0.04	0.01
Val D'Aosta	0.16	0.16	0.00	0.00
Lombardia	0.08	0.01	0.03	0.01
Trentino Alto Adige	0.13	0.05	0.02	0.02
Veneto	0.07	0.02	0.03	0.01
Friuli Venezia Giulia	0.15	0.04	0.03	0.02
Liguria	0.06	0.02	0.03	0.02
Emilia Romagna	0.06	0.02	0.03	0.01
Toscana	0.08	0.02	0.04	0.01
Umbria	0.00	0.00	0.05	0.03
Marche	0.07	0.03	0.00	0.00
Lazio	0.12	0.02	0.05	0.01
Abruzzi	0.11	0.04	0.06	0.03
Molise	0.04	0.04	0.00	0.00
Campania	0.14	0.02	0.03	0.01
Puglia	0.12	0.02	0.03	0.01
Basilicata	0.00	0.00	0.10	0.06
Calabria	0.10	0.03	0.01	0.01
Sicilia	0.06	0.01	0.04	0.01
Sardegna	0.15	0.04	0.03	0.02
Nord	0.08	0.01	0.03	0.00
Centro	0.09	0.01	0.04	0.01
Sud e Isole	0.10	0.01	0.03	0.01

CAUSA: 010-018 137.0-137.4 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

TUMORI**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ¹	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.6	0.07	0.5	0.06
5-9	0.5	0.06	0.4	0.05
10-14	0.6	0.06	0.4	0.05
15-19	0.7	0.06	0.5	0.05
20-24	0.7	0.06	0.6	0.05
25-29	0.9	0.06	1.0	0.07
30-34	1.5	0.08	1.8	0.09
35-39	2.7	0.12	3.2	0.13
40-44	5.9	0.18	5.6	0.17
45-49	11.5	0.25	10.1	0.23
50-54	23.8	0.37	16.2	0.30
55-59	41.5	0.49	23.6	0.36
60-64	71.2	0.66	33.4	0.43
65-69	112.2	0.88	47.4	0.53
70-74	154.0	1.15	69.5	0.67
TASSO STANDARDIZZATO	17.9	0.07	10.8	0.06

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	18.2	0.3	11.7	0.2
Val D'Aosta	18.8	1.6	10.8	1.3
Lombardia	21.8	0.2	11.9	0.2
Trentino Alto Adige	19.5	0.6	10.0	0.5
Veneto	20.7	0.3	11.1	0.2
Friuli Venezia Giulia	21.8	0.5	11.7	0.4
Liguria	18.0	0.4	11.2	0.3
Emilia Romagna	17.1	0.3	11.1	0.2
Toscana	17.9	0.3	10.6	0.2
Umbria	16.1	0.5	10.6	0.5
Marche	15.2	0.4	9.5	0.3
Lazio	17.5	0.2	11.1	0.2
Abruzzi	14.8	0.4	8.6	0.3
Molise	13.4	0.8	7.6	0.6
Campania	17.8	0.3	10.8	0.2
Puglia	15.2	0.3	9.3	0.2
Basilicata	12.4	0.6	9.1	0.5
Calabria	13.7	0.4	8.3	0.3
Sicilia	14.2	0.2	10.0	0.2
Sardegna	16.8	0.5	10.3	0.4
Nord	19.8	0.1	11.5	0.1
Centro	17.2	0.2	10.7	0.1
Sud e Isole	15.4	0.1	9.8	0.1

CAUSA: 140-239 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

TUMORI: STOMACO**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.00	0.00	0.01	0.01
20-24	0.00	0.00	0.02	0.01
25-29	0.03	0.01	0.05	0.01
30-34	0.12	0.02	0.11	0.02
35-39	0.23	0.03	0.17	0.03
40-44	0.48	0.05	0.25	0.04
45-49	0.86	0.07	0.52	0.05
50-54	1.67	0.10	0.83	0.07
55-59	2.94	0.13	1.35	0.09
60-64	5.20	0.18	2.17	0.11
65-69	8.41	0.25	3.04	0.14
70-74	12.84	0.34	5.28	0.19
TASSO STANDARDIZZATO	1.33	0.02	0.67	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	1.09	0.06	0.62	0.05
Val D'Aosta	1.01	0.38	0.22	0.16
Lombardia	1.72	0.06	0.86	0.04
Trentino Alto Adige	1.41	0.17	0.80	0.13
Veneto	1.13	0.07	0.53	0.05
Friuli Venezia Giulia	1.61	0.15	0.74	0.10
Liguria	1.14	0.10	0.60	0.07
Emilia Romagna	1.65	0.08	0.82	0.06
Toscana	1.71	0.09	0.68	0.05
Umbria	1.90	0.18	1.10	0.15
Marche	1.66	0.13	0.76	0.09
Lazio	1.29	0.07	0.62	0.05
Abruzzi	1.30	0.13	0.74	0.10
Molise	1.32	0.27	0.78	0.22
Campania	1.26	0.07	0.58	0.05
Puglia	0.85	0.06	0.52	0.05
Basilicata	1.11	0.18	0.66	0.14
Calabria	1.07	0.10	0.51	0.07
Sicilia	0.92	0.06	0.55	0.05
Sardegna	0.75	0.09	0.44	0.07
Nord	1.44	0.03	0.73	0.02
Centro	1.54	0.05	0.70	0.03
Sud e Isole	1.03	0.03	0.56	0.02

CAUSA: 151 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

TUMORI: COLON**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORI STANDARD	TASSO	ERRORI STANDARD
0-4	0.01	0.01	0.05	0.02
5-9	0.00	0.00	0.01	0.01
10-14	0.01	0.01	0.01	0.01
15-19	0.01	0.01	0.00	0.00
20-24	0.02	0.01	0.00	0.00
25-29	0.03	0.01	0.03	0.01
30-34	0.10	0.02	0.11	0.02
35-39	0.23	0.03	0.16	0.03
40-44	0.46	0.05	0.38	0.04
45-49	0.72	0.06	0.71	0.06
50-54	1.57	0.10	1.38	0.09
55-59	2.56	0.12	2.09	0.11
60-64	4.37	0.17	2.97	0.13
65-69	7.59	0.23	4.62	0.17
70-74	11.72	0.33	7.16	0.22
TASSO STANDARDIZZATO	1.19	0.02	0.96	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	1.29	0.07	1.14	0.07
Vai D'Aosta	0.41	0.23	1.03	0.37
Lombardia	1.37	0.05	1.13	0.05
Trentino Alto Adige	1.57	0.18	0.85	0.13
Veneto	1.29	0.07	0.86	0.06
Friuli Venezia Giulia	1.38	0.13	0.97	0.11
Liguria	1.46	0.11	1.15	0.10
Emilia Romagna	1.37	0.07	1.03	0.06
Toscana	1.20	0.07	1.09	0.07
Umbria	1.26	0.15	0.91	0.13
Marche	1.26	0.12	1.06	0.11
Lazio	1.23	0.06	1.03	0.06
Abruzzi	0.98	0.11	0.67	0.10
Molise	0.74	0.18	0.50	0.15
Campania	0.94	0.06	0.81	0.06
Puglia	0.92	0.07	0.72	0.06
Basilicata	0.99	0.17	0.75	0.15
Calabria	0.95	0.10	0.79	0.09
Sicilia	0.91	0.06	0.81	0.06
Sardegna	0.94	0.11	0.84	0.10
Nord	1.35	0.03	1.05	0.03
Centro	1.23	0.04	1.04	0.04
Sud e Isole	0.93	0.03	0.77	0.03

CAUSA: 153 159.0 159.9 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**TUMORI: RETTO E GIUNZIONE
RETTOSIGMOIDEA**

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.01	0.01	0.01	0.01
5-9	0.01	0.01	0.01	0.01
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.00	0.00	0.00	0.00
20-24	0.01	0.01	0.00	0.00
25-29	0.01	0.01	0.01	0.01
30-34	0.02	0.01	0.04	0.01
35-39	0.09	0.02	0.06	0.02
40-44	0.15	0.03	0.14	0.03
45-49	0.28	0.04	0.23	0.03
50-54	0.65	0.06	0.37	0.05
55-59	1.08	0.08	0.54	0.05
60-64	1.99	0.11	0.81	0.07
65-69	2.90	0.15	1.33	0.09
70-74	3.92	0.19	2.33	0.13
TASSO STANDARDIZZATO	0.46	0.01	0.28	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.50	0.04	0.28	0.03
Val D'Aosta	0.30	0.21	0.17	0.17
Lombardia	0.54	0.03	0.29	0.02
Trentino Alto Adige	0.77	0.13	0.38	0.09
Veneto	0.48	0.04	0.28	0.03
Friuli Venezia Giulia	0.63	0.09	0.33	0.06
Liguria	0.48	0.06	0.19	0.04
Emilia Romagna	0.41	0.04	0.27	0.03
Toscana	0.49	0.05	0.27	0.04
Umbria	0.40	0.09	0.37	0.08
Marche	0.46	0.07	0.37	0.06
Lazio	0.48	0.04	0.32	0.03
Abruzzi	0.40	0.08	0.20	0.05
Molise	0.46	0.16	0.43	0.14
Campania	0.34	0.04	0.25	0.03
Puglia	0.32	0.04	0.23	0.03
Basilicata	0.53	0.13	0.44	0.12
Calabria	0.56	0.07	0.28	0.05
Sicilia	0.39	0.04	0.28	0.03
Sardegna	0.44	0.07	0.25	0.06
Nord	0.51	0.02	0.28	0.01
Centro	0.47	0.03	0.31	0.02
Sud e Isole	0.39	0.02	0.26	0.02

CAUSA: 154 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**TUMORI: TRACHEA, BRONCHI
POLMONI**

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.02	0.01	0.01	0.01
5-9	0.01	0.01	0.00	0.00
10-14	0.01	0.01	0.01	0.01
15-19	0.02	0.01	0.01	0.01
20-24	0.01	0.01	0.01	0.01
25-29	0.04	0.01	0.03	0.01
30-34	0.11	0.02	0.07	0.02
35-39	0.34	0.04	0.18	0.03
40-44	1.36	0.09	0.39	0.05
45-49	3.30	0.13	0.79	0.06
50-54	7.44	0.21	1.28	0.08
55-59	14.04	0.29	1.93	0.10
60-64	25.36	0.40	3.05	0.13
65-69	39.38	0.53	4.69	0.17
70-74	48.71	0.66	6.22	0.20
TASSO STANDARDIZZATO	5.79	0.04	0.92	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	5.97	0.15	1.07	0.06
Val D'Aosta	6.54	0.96	1.56	0.48
Lombardia	7.18	0.12	1.03	0.04
Trentino Alto Adige	5.37	0.34	1.02	0.15
Veneto	7.03	0.17	1.22	0.07
Friuli Venezia Giulia	6.17	0.29	1.31	0.13
Liguria	5.56	0.22	1.09	0.10
Emilia Romagna	5.60	0.15	1.17	0.07
Toscana	5.77	0.16	0.90	0.06
Umbria	4.85	0.29	0.61	0.11
Marche	4.55	0.22	0.53	0.08
Lazio	6.01	0.14	1.26	0.07
Abruzzi	4.19	0.23	0.47	0.08
Molise	3.64	0.43	0.22	0.11
Campania	6.32	0.15	0.78	0.05
Puglia	4.98	0.16	0.48	0.05
Basilicata	3.49	0.32	0.35	0.10
Calabria	3.45	0.18	0.42	0.06
Sicilia	4.55	0.13	0.63	0.05
Sardegna	5.36	0.26	0.65	0.09
Nord	6.43	0.06	1.11	0.03
Centro	5.63	0.09	0.99	0.04
Sud e Isole	4.95	0.07	0.60	0.02

CAUSA: 162 ICD IX REV.

 DATI: ISTAT
 ELABORAZIONI: LEB-ISS

TUMORI: MAMMELLA**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.00	0.00	0.01	0.01
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	0.00	0.00	0.01	0.01
20-24	0.00	0.00	0.01	0.01
25-29	0.00	0.00	0.11	0.02
30-34	0.00	0.00	0.42	0.04
35-39	0.00	0.00	1.07	0.07
40-44	0.01	0.01	1.92	0.10
45-49	0.01	0.01	3.49	0.13
50-54	0.02	0.01	5.05	0.17
55-59	0.02	0.01	6.54	0.19
60-64	0.08	0.02	7.59	0.21
65-69	0.08	0.02	8.78	0.23
70-74	0.18	0.04	10.47	0.27
TASSO STANDARDIZZATO	0.02	0.00	2.40	0.03

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.01	0.01	2.74	0.10
Val D'Aosta	0.00	0.00	2.68	0.64
Lombardia	0.03	0.01	2.89	0.08
Trentino Alto Adige	0.02	0.02	2.01	0.21
Veneto	0.01	0.01	2.30	0.10
Friuli Venezia Giulia	0.00	0.00	2.58	0.19
Liguria	0.00	0.00	2.59	0.15
Emilia Romagna	0.00	0.00	2.37	0.10
Toscana	0.01	0.01	2.20	0.10
Umbria	0.02	0.02	2.32	0.22
Marche	0.01	0.01	2.33	0.17
Lazio	0.01	0.01	2.38	0.09
Abruzzi	0.00	0.00	1.69	0.16
Molise	0.00	0.00	1.78	0.32
Campania	0.02	0.01	2.25	0.09
Puglia	0.04	0.01	2.23	0.11
Basilicata	0.03	0.03	1.65	0.24
Calabria	0.00	0.00	1.69	0.13
Sicilia	0.01	0.01	2.22	0.09
Sardegna	0.02	0.02	2.48	0.18
Nord	0.02	0.00	2.62	0.04
Centro	0.01	0.00	2.31	0.06
Sud e Isole	0.02	0.00	2.14	0.05

CAUSA: 174 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

TUMORI: UTERO**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4			0.01	0.01
5-9			0.01	0.01
10-14			0.00	0.00
15-19			0.00	0.01
20-24			0.02	0.01
25-29			0.04	0.01
30-34			0.15	0.03
35-39			0.20	0.03
40-44			0.39	0.05
45-49			0.64	0.06
50-54			0.84	0.07
55-59			1.23	0.08
60-64			1.83	0.10
65-69			2.19	0.12
70-74			3.59	0.16
TASSO STANDARDIZZATO			0.57	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte			0.63	0.05
Val D'Aosta			0.67	0.34
Lombardia			0.47	0.03
Trentino Alto Adige			0.42	0.09
Veneto			0.46	0.04
Friuli Venezia Giulia			0.57	0.09
Liguria			0.50	0.07
Emilia Romagna			0.56	0.05
Toscana			0.49	0.05
Umbria			0.36	0.08
Marche			0.43	0.07
Lazio			0.49	0.04
Abruzzi			0.59	0.09
Molise			0.60	0.18
Campania			0.73	0.05
Puglia			0.63	0.06
Basilicata			0.67	0.14
Calabria			0.73	0.08
Sicilia			0.73	0.05
Sardegna			0.57	0.08
Nord			0.52	0.02
Centro			0.47	0.03
Sud e Isole			0.68	0.03

CAUSA: 179 180 182 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

LEUCEMIA

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.12	0.03	0.11	0.03
5-9	0.12	0.03	0.12	0.03
10-14	0.24	0.04	0.14	0.03
15-19	0.23	0.03	0.14	0.03
20-24	0.18	0.03	0.12	0.02
25-29	0.21	0.03	0.13	0.02
30-34	0.18	0.03	0.11	0.02
35-39	0.20	0.03	0.20	0.03
40-44	0.32	0.04	0.15	0.03
45-49	0.41	0.05	0.39	0.04
50-54	0.66	0.06	0.51	0.05
55-59	0.92	0.07	0.74	0.06
60-64	1.63	0.10	1.03	0.08
65-69	2.63	0.14	1.44	0.09
70-74	4.12	0.19	2.33	0.13
TASSO STANDARDIZZATO	0.56	0.01	0.40	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.50	0.05	0.41	0.04
Val D'Aosta	0.84	0.35	0.31	0.22
Lombardia	0.59	0.04	0.41	0.03
Trentino Alto Adige	0.26	0.07	0.20	0.06
Veneto	0.49	0.05	0.41	0.04
Friuli Venezia Giulia	0.34	0.07	0.34	0.07
Liguria	0.43	0.07	0.32	0.06
Emilia Romagna	0.49	0.05	0.39	0.04
Toscana	0.61	0.06	0.40	0.05
Umbria	0.69	0.12	0.37	0.08
Marche	0.56	0.08	0.37	0.07
Lazio	0.60	0.05	0.50	0.04
Abruzzi	0.65	0.10	0.41	0.08
Molise	0.69	0.20	0.23	0.12
Campania	0.63	0.05	0.43	0.04
Puglia	0.49	0.05	0.36	0.04
Basilicata	0.43	0.11	0.19	0.08
Calabria	0.68	0.08	0.46	0.07
Sicilia	0.57	0.05	0.44	0.04
Sardegna	0.68	0.09	0.40	0.07
Nord	0.51	0.02	0.39	0.02
Centro	0.60	0.03	0.44	0.03
Sud e Isole	0.59	0.02	0.40	0.02

CAUSA: 204-208 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

DIABETE MELLITO**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.01	0.01	0.05	0.02
5-9	0.00	0.00	0.01	0.01
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.01	0.01	0.00	0.00
20-24	0.01	0.01	0.00	0.00
25-29	0.00	0.00	0.01	0.01
30-34	0.05	0.02	0.03	0.01
35-39	0.09	0.02	0.05	0.02
40-44	0.24	0.04	0.16	0.03
45-49	0.48	0.05	0.19	0.03
50-54	0.83	0.07	0.48	0.05
55-59	1.74	0.10	1.10	0.08
60-64	3.42	0.15	2.51	0.12
65-69	6.07	0.21	5.18	0.18
70-74	9.40	0.29	10.76	0.27
TASSO STANDARDIZZATO	0.89	0.02	0.92	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.62	0.05	0.49	0.04
Val D'Aosta	0.40	0.23	1.04	0.37
Lombardia	0.66	0.04	0.56	0.03
Trentino Alto Adige	0.68	0.12	0.57	0.11
Veneto	0.62	0.05	0.52	0.04
Friuli Venezia Giulia	0.89	0.11	0.52	0.08
Liguria	0.78	0.08	0.75	0.08
Emilia Romagna	0.59	0.05	0.39	0.04
Toscana	0.66	0.05	0.53	0.05
Umbria	0.63	0.10	0.50	0.09
Marche	0.56	0.08	0.53	0.07
Lazio	0.87	0.05	0.87	0.05
Abruzzi	0.93	0.11	0.96	0.11
Molise	0.76	0.18	1.25	0.24
Campania	1.52	0.08	2.27	0.09
Puglia	1.23	0.08	1.47	0.08
Basilicata	1.30	0.19	1.08	0.17
Calabria	1.13	0.10	1.56	0.12
Sicilia	1.59	0.08	1.85	0.08
Sardegna	0.75	0.09	0.90	0.11
Nord	0.65	0.02	0.53	0.02
Centro	0.73	0.03	0.68	0.03
Sud e Isole	1.32	0.04	1.68	0.04

CAUSA: 250 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

ANEMIA**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.02	0.01	0.02	0.01
5-9	0.03	0.02	0.01	0.01
10-14	0.03	0.01	0.05	0.02
15-19	0.10	0.02	0.05	0.02
20-24	0.13	0.02	0.05	0.01
25-29	0.05	0.01	0.05	0.01
30-34	0.01	0.01	0.05	0.01
35-39	0.02	0.01	0.02	0.01
40-44	0.03	0.01	0.04	0.02
45-49	0.02	0.01	0.04	0.01
50-54	0.05	0.02	0.06	0.02
55-59	0.08	0.02	0.08	0.02
60-64	0.10	0.02	0.10	0.02
65-69	0.20	0.04	0.17	0.03
70-74	0.69	0.08	0.45	0.06
TASSO STANDARDIZZATO	0.07	0.01	0.07	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.08	0.02	0.07	0.02
Val D'Aosta	0.26	0.19	0.31	0.22
Lombardia	0.06	0.01	0.06	0.01
Trentino Alto Adige	0.02	0.02	0.00	0.00
Veneto	0.07	0.02	0.06	0.02
Friuli Venezia Giulia	0.02	0.02	0.02	0.02
Liguria	0.08	0.04	0.02	0.01
Emilia Romagna	0.06	0.02	0.06	0.02
Toscana	0.05	0.02	0.05	0.01
Umbria	0.06	0.03	0.06	0.03
Marche	0.05	0.03	0.05	0.02
Lazio	0.07	0.02	0.06	0.02
Abruzzi	0.02	0.01	0.07	0.03
Molise	0.06	0.05	0.14	0.08
Campania	0.07	0.02	0.06	0.01
Puglia	0.08	0.02	0.10	0.02
Basilicata	0.10	0.06	0.12	0.06
Calabria	0.11	0.03	0.08	0.03
Sicilia	0.11	0.02	0.07	0.02
Sardegna	0.16	0.04	0.13	0.04
Nord	0.06	0.01	0.06	0.01
Centro	0.06	0.01	0.06	0.01
Sud e Isole	0.09	0.01	0.08	0.01

CAUSA: 280-285 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

DISTURBI PSICHICI**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.01	0.01	0.00	0.00
5-9	0.00	0.00	0.01	0.01
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	0.13	0.03	0.04	0.01
20-24	0.67	0.05	0.08	0.02
25-29	1.00	0.07	0.10	0.02
30-34	1.01	0.07	0.08	0.02
35-39	0.65	0.06	0.10	0.02
40-44	0.36	0.04	0.06	0.02
45-49	0.21	0.03	0.11	0.02
50-54	0.38	0.05	0.09	0.02
55-59	0.48	0.05	0.13	0.03
60-64	0.54	0.06	0.30	0.04
65-69	1.05	0.09	0.73	0.07
70-74	2.15	0.14	1.82	0.11
TASSO STANDARDIZZATO	0.47	0.01	0.17	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.53	0.05	0.21	0.03
Val D'Aosta	0.67	0.31	0.00	0.00
Lombardia	0.49	0.03	0.17	0.02
Trentino Alto Adige	0.49	0.10	0.12	0.05
Veneto	0.57	0.05	0.19	0.03
Friuli Venezia Giulia	0.64	0.10	0.37	0.07
Liguria	0.66	0.09	0.23	0.05
Emilia Romagna	0.58	0.05	0.21	0.03
Toscana	0.39	0.05	0.15	0.02
Umbria	0.36	0.09	0.23	0.07
Marche	0.36	0.07	0.13	0.04
Lazio	0.52	0.04	0.16	0.02
Abruzzi	0.45	0.08	0.19	0.05
Molise	0.29	0.12	0.18	0.09
Campania	0.26	0.03	0.12	0.02
Puglia	0.55	0.05	0.13	0.03
Basilicata	0.45	0.12	0.08	0.05
Calabria	0.25	0.05	0.14	0.04
Sicilia	0.31	0.04	0.18	0.03
Sardegna	0.63	0.08	0.24	0.05
Nord	0.54	0.02	0.20	0.01
Centro	0.45	0.03	0.16	0.02
Sud e Isole	0.38	0.02	0.15	0.01

CAUSA: 290-319 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

**MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
E DEGLI ORGANI DEI SENSI**

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	1.97	0.28	1.21	0.22
1-4	0.34	0.05	0.18	0.04
5-9	0.15	0.03	0.12	0.03
10-14	0.15	0.03	0.17	0.03
15-19	0.35	0.04	0.11	0.02
20-24	0.20	0.03	0.10	0.02
25-29	0.15	0.03	0.10	0.02
30-34	0.24	0.03	0.18	0.03
35-39	0.35	0.04	0.19	0.03
40-44	0.37	0.04	0.24	0.04
45-49	0.40	0.05	0.42	0.05
50-54	0.82	0.07	0.56	0.06
55-59	1.34	0.09	0.96	0.07
60-64	2.03	0.11	1.43	0.09
65-69	3.42	0.16	2.83	0.13
70-74	6.74	0.25	5.11	0.19
TASSO STANDARDIZZATO	0.78	0.02	0.64	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.92	0.07	0.74	0.06
Val D'Aosta	1.45	0.56	0.37	0.22
Lombardia	0.78	0.04	0.49	0.03
Trentino Alto Adige	0.70	0.13	0.47	0.10
Veneto	0.73	0.06	0.59	0.05
Friuli Venezia Giulia	1.01	0.13	0.72	0.10
Liguria	0.95	0.10	0.85	0.09
Emilia Romagna	0.66	0.06	0.69	0.06
Toscana	0.78	0.07	0.80	0.06
Umbria	0.67	0.14	0.41	0.09
Marche	0.70	0.09	0.74	0.10
Lazio	0.67	0.05	0.64	0.05
Abruzzi	0.87	0.12	0.48	0.08
Molise	0.76	0.20	0.71	0.20
Campania	0.81	0.06	0.59	0.05
Puglia	0.75	0.06	0.69	0.06
Basilicata	0.50	0.13	0.63	0.15
Calabria	0.58	0.08	0.53	0.07
Sicilia	0.90	0.06	0.78	0.06
Sardegna	0.83	0.11	0.61	0.09
Nord	0.80	0.03	0.62	0.02
Centro	0.71	0.04	0.69	0.03
Sud e Isole	0.79	0.03	0.65	0.03

CAUSA: 320-389 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**MALATTIE DEL SISTEMA
CIRCOLATORIO**

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.5	0.06	0.8	0.08
5-9	0.2	0.04	0.3	0.05
10-14	0.1	0.03	0.1	0.03
15-19	0.4	0.05	0.2	0.03
20-24	0.5	0.05	0.3	0.04
25-29	0.7	0.05	0.5	0.05
30-34	1.2	0.07	0.4	0.04
35-39	2.2	0.11	1.0	0.07
40-44	4.7	0.16	1.6	0.09
45-49	8.5	0.21	3.0	0.12
50-54	14.9	0.29	4.6	0.16
55-59	24.8	0.38	8.1	0.21
60-64	46.8	0.54	17.4	0.31
65-69	82.9	0.76	36.1	0.46
70-74	145.0	1.11	78.9	0.72
TASSO STANDARDIZZATO	13.3	0.06	7.0	0.05

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	13.9	0.2	7.1	0.2
Val D'Aosta	14.1	1.4	6.5	1.0
Lombardia	13.6	0.2	6.5	0.1
Trentino Alto Adige	13.7	0.5	5.8	0.3
Veneto	12.7	0.2	5.8	0.1
Friuli Venezia Giulia	13.2	0.4	6.5	0.3
Liguria	12.6	0.3	6.7	0.2
Emilia Romagna	12.3	0.2	5.9	0.2
Toscana	12.0	0.2	5.7	0.2
Umbria	11.8	0.5	6.5	0.3
Marche	11.0	0.3	5.4	0.2
Lazio	13.6	0.2	6.8	0.1
Abruzzi	12.8	0.4	6.9	0.3
Molise	11.9	0.8	8.0	0.6
Campania	16.7	0.2	9.6	0.2
Puglia	11.4	0.2	7.2	0.2
Basilicata	12.9	0.6	8.1	0.5
Calabria	13.5	0.4	8.4	0.3
Sicilia	14.1	0.2	9.0	0.2
Sardegna	12.7	0.4	6.6	0.3
Nord	13.2	0.1	6.4	0.1
Centro	12.6	0.1	6.2	0.1
Sud e Isole	13.9	0.1	8.4	0.1

CAUSA: 390-459 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.01	0.01	0.01	0.01
15-19	0.00	0.01	0.00	0.00
20-24	0.01	0.01	0.00	0.00
25-29	0.02	0.01	0.00	0.00
30-34	0.02	0.01	0.03	0.01
35-39	0.03	0.01	0.04	0.01
40-44	0.05	0.02	0.06	0.02
45-49	0.09	0.02	0.12	0.03
50-54	0.18	0.03	0.23	0.04
55-59	0.21	0.04	0.32	0.04
60-64	0.47	0.06	0.60	0.06
65-69	0.55	0.06	0.92	0.07
70-74	0.80	0.09	1.31	0.09
TASSO STANDARDIZZATO	0.11	0.01	0.18	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.08	0.02	0.19	0.03
Val D'Aosta	0.26	0.19	0.16	0.16
Lombardia	0.11	0.02	0.20	0.02
Trentino Alto Adige	0.24	0.07	0.11	0.04
Veneto	0.12	0.02	0.10	0.02
Friuli Venezia Giulia	0.19	0.05	0.20	0.05
Liguria	0.12	0.03	0.26	0.05
Emilia Romagna	0.13	0.02	0.16	0.02
Toscana	0.06	0.02	0.10	0.02
Umbria	0.10	0.05	0.13	0.05
Marche	0.11	0.04	0.20	0.05
Lazio	0.11	0.02	0.10	0.02
Abruzzi	0.07	0.03	0.18	0.05
Molise	0.12	0.08	0.39	0.14
Campania	0.15	0.02	0.22	0.03
Puglia	0.05	0.02	0.21	0.03
Basilicata	0.13	0.06	0.36	0.11
Calabria	0.12	0.04	0.15	0.04
Sicilia	0.08	0.02	0.19	0.03
Sardegna	0.09	0.03	0.25	0.05
Nord	0.12	0.01	0.18	0.01
Centro	0.09	0.01	0.12	0.01
Sud e Isole	0.10	0.01	0.21	0.01

CAUSA: 393-398 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

IPERTENSIONE**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.03	0.01	0.06	0.02
5-9	0.00	0.00	0.03	0.01
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	0.00	0.01	0.00	0.00
20-24	0.00	0.00	0.02	0.01
25-29	0.01	0.01	0.01	0.01
30-34	0.01	0.01	0.01	0.01
35-39	0.07	0.02	0.06	0.02
40-44	0.17	0.03	0.07	0.02
45-49	0.26	0.04	0.13	0.03
50-54	0.61	0.06	0.35	0.04
55-59	1.03	0.08	0.60	0.06
60-64	2.22	0.12	1.54	0.09
65-69	4.24	0.18	3.17	0.14
70-74	7.75	0.27	7.04	0.22
TASSO STANDARDIZZATO	0.63	0.01	0.58	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.60	0.05	0.52	0.04
Val D'Aosta	0.17	0.17	0.30	0.21
Lombardia	0.42	0.03	0.41	0.03
Trentino Alto Adige	0.43	0.09	0.26	0.07
Veneto	0.44	0.04	0.36	0.04
Friuli Venezia Giulia	0.71	0.10	0.48	0.08
Liguria	0.52	0.07	0.43	0.06
Emilia Romagna	0.56	0.04	0.37	0.04
Toscana	0.48	0.04	0.30	0.04
Umbria	0.58	0.10	0.34	0.07
Marche	0.33	0.06	0.42	0.06
Lazio	0.71	0.05	0.64	0.05
Abruzzi	0.52	0.08	0.58	0.08
Molise	0.36	0.13	0.76	0.21
Campania	1.02	0.06	1.00	0.06
Puglia	0.89	0.07	0.98	0.07
Basilicata	0.74	0.14	0.83	0.16
Calabria	0.83	0.09	0.96	0.09
Sicilia	0.95	0.06	0.99	0.06
Sardegna	0.64	0.09	0.69	0.09
Nord	0.50	0.02	0.41	0.02
Centro	0.56	0.03	0.47	0.03
Sud e Isole	0.87	0.03	0.92	0.03

CAUSA: 401-405 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.06	0.02	0.05	0.02
5-9	0.03	0.01	0.05	0.02
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.04	0.01	0.01	0.01
20-24	0.07	0.02	0.03	0.01
25-29	0.14	0.02	0.03	0.01
30-34	0.34	0.04	0.08	0.02
35-39	0.85	0.07	0.15	0.03
40-44	2.32	0.11	0.33	0.04
45-49	4.71	0.16	0.83	0.07
50-54	8.00	0.22	1.26	0.08
55-59	13.64	0.28	2.54	0.12
60-64	23.86	0.39	5.87	0.18
65-69	39.22	0.53	12.51	0.27
70-74	62.72	0.75	26.10	0.42
TASSO STANDARDIZZATO	6.33	0.04	2.24	0.03

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	5.95	0.15	2.03	0.08
Val D'Aosta	5.92	0.92	1.83	0.50
Lombardia	6.92	0.12	2.31	0.06
Trentino Alto Adige	6.58	0.37	2.33	0.21
Veneto	6.19	0.16	2.03	0.09
Friuli Venezia Giulia	6.23	0.29	2.21	0.16
Liguria	6.14	0.23	2.11	0.13
Emilia Romagna	6.32	0.16	2.02	0.09
Toscana	5.37	0.15	1.94	0.09
Umbria	5.80	0.33	2.63	0.21
Marche	5.57	0.24	1.76	0.13
Lazio	6.98	0.15	2.41	0.09
Abruzzi	5.58	0.27	2.22	0.17
Molise	5.37	0.53	2.23	0.32
Campania	7.76	0.17	3.00	0.10
Puglia	5.19	0.16	2.09	0.10
Basilicata	5.63	0.41	2.00	0.24
Calabria	5.61	0.23	2.09	0.14
Sicilia	6.47	0.16	2.45	0.09
Sardegna	6.19	0.27	2.15	0.16
Nord	6.42	0.06	2.14	0.04
Centro	6.13	0.09	2.17	0.06
Sud e Isole	6.32	0.08	2.43	0.05

CAUSA: 410-414 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

INFARTO MIOCARDICO ACUTO

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.04	0.02	0.03	0.02
5-9	0.01	0.01	0.01	0.01
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.03	0.01	0.01	0.01
20-24	0.07	0.02	0.01	0.01
25-29	0.12	0.02	0.02	0.01
30-34	0.28	0.04	0.07	0.02
35-39	0.72	0.06	0.13	0.03
40-44	1.87	0.10	0.25	0.04
45-49	3.64	0.14	0.61	0.06
50-54	5.84	0.18	0.91	0.07
55-59	9.67	0.24	1.69	0.10
60-64	15.94	0.32	4.03	0.15
65-69	24.60	0.42	7.82	0.22
70-74	36.92	0.58	15.11	0.32
TASSO STANDARDIZZATO	4.16	0.04	1.40	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	3.85	0.12	1.29	0.07
Val D'Aosta	4.35	0.78	1.18	0.40
Lombardia	4.34	0.09	1.47	0.05
Trentino Alto Adige	4.58	0.31	1.65	0.18
Veneto	4.48	0.13	1.39	0.07
Friuli Venezia Giulia	3.77	0.23	1.31	0.13
Liguria	4.09	0.19	1.54	0.11
Emilia Romagna	4.16	0.13	1.27	0.07
Toscana	3.23	0.12	1.15	0.07
Umbria	3.89	0.27	1.50	0.16
Marche	3.64	0.20	1.14	0.11
Lazio	4.46	0.12	1.45	0.07
Abruzzo	3.80	0.23	1.52	0.14
Molise	4.15	0.47	1.26	0.24
Campania	5.14	0.14	1.75	0.08
Puglia	3.53	0.13	1.21	0.08
Basilicata	3.94	0.34	1.25	0.19
Calabria	3.92	0.19	1.28	0.11
Sicilia	4.34	0.13	1.55	0.08
Sardegna	4.28	0.23	1.34	0.13
Nord	4.21	0.05	1.39	0.03
Centro	3.87	0.08	1.30	0.04
Sud e Isole	4.28	0.06	1.47	0.04

CAUSA: 410 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

MALATTIE CEREBROVASCOLARI**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.14	0.03	0.20	0.04
5-9	0.08	0.02	0.10	0.03
10-14	0.06	0.02	0.03	0.01
15-19	0.11	0.02	0.07	0.02
20-24	0.07	0.02	0.08	0.02
25-29	0.11	0.02	0.19	0.03
30-34	0.28	0.04	0.18	0.03
35-39	0.50	0.05	0.39	0.04
40-44	0.90	0.07	0.60	0.06
45-49	1.29	0.08	1.01	0.07
50-54	2.39	0.12	1.46	0.09
55-59	4.27	0.16	2.44	0.12
60-64	8.91	0.24	4.75	0.17
65-69	18.01	0.36	10.35	0.25
70-74	35.98	0.57	24.58	0.41
TASSO STANDARDIZZATO	2.79	0.03	2.11	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	3.13	0.11	2.20	0.09
Val D'Aosta	2.52	0.60	1.04	0.37
Lombardia	2.72	0.07	1.86	0.06
Trentino Alto Adige	2.40	0.22	1.58	0.17
Veneto	2.31	0.10	1.59	0.08
Friuli Venezia Giulia	2.31	0.18	1.84	0.15
Liguria	2.30	0.14	1.94	0.13
Emilia Romagna	2.31	0.09	1.83	0.08
Toscana	2.62	0.11	1.76	0.08
Umbria	2.85	0.22	2.16	0.20
Marche	2.35	0.15	1.85	0.14
Lazio	2.59	0.09	1.90	0.08
Abruzzi	2.85	0.19	2.06	0.16
Molise	3.02	0.39	2.47	0.34
Campania	3.81	0.12	2.96	0.10
Puglia	2.55	0.11	2.09	0.10
Basilicata	3.02	0.29	2.57	0.27
Calabria	3.31	0.17	2.74	0.16
Sicilia	3.44	0.11	3.25	0.11
Sardegna	2.79	0.18	1.84	0.15
Nord	2.59	0.04	1.86	0.03
Centro	2.59	0.06	1.87	0.05
Sud e Isole	3.23	0.05	2.67	0.05

CAUSA: 430-438 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

ARTERIOSCLEROSI**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	0.00	0.00	0.00	0.00
20-24	0.00	0.00	0.00	0.00
25-29	0.00	0.00	0.01	0.01
30-34	0.00	0.00	0.00	0.00
35-39	0.01	0.01	0.00	0.00
40-44	0.00	0.01	0.00	0.01
45-49	0.05	0.02	0.02	0.01
50-54	0.08	0.02	0.03	0.01
55-59	0.20	0.03	0.06	0.02
60-64	0.44	0.05	0.15	0.03
65-69	1.21	0.09	0.30	0.04
70-74	2.58	0.15	1.16	0.09
TASSO STANDARDIZZATO	0.16	0.01	0.07	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.24	0.03	0.07	0.02
Val D'Aosta	0.38	0.22	0.25	0.18
Lombardia	0.20	0.02	0.08	0.01
Trentino Alto Adige	0.16	0.06	0.03	0.02
Veneto	0.25	0.03	0.07	0.02
Friuli Venezia Giulia	0.22	0.05	0.11	0.03
Liguria	0.15	0.03	0.04	0.02
Emilia Romagna	0.22	0.03	0.10	0.02
Toscana	0.18	0.03	0.05	0.01
Umbria	0.05	0.03	0.03	0.02
Marche	0.25	0.05	0.07	0.03
Lazio	0.06	0.01	0.05	0.01
Abruzzi	0.14	0.04	0.03	0.02
Molise	0.00	0.00	0.00	0.00
Campania	0.14	0.02	0.08	0.02
Puglia	0.08	0.02	0.06	0.02
Basilicata	0.07	0.04	0.09	0.05
Calabria	0.12	0.03	0.07	0.03
Sicilia	0.11	0.02	0.13	0.02
Sardegna	0.04	0.02	0.07	0.03
Nord	0.22	0.01	0.08	0.01
Centro	0.13	0.01	0.05	0.01
Sud e Isole	0.11	0.01	0.08	0.01

CAUSA: 440 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

**MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO**
1994
TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	1.57	0.25	1.59	0.26
1-4	0.16	0.04	0.21	0.04
5-9	0.06	0.02	0.12	0.03
10-14	0.04	0.02	0.06	0.02
15-19	0.09	0.02	0.06	0.02
20-24	0.13	0.02	0.10	0.02
25-29	0.22	0.03	0.08	0.02
30-34	0.21	0.03	0.11	0.02
35-39	0.28	0.04	0.11	0.02
40-44	0.23	0.04	0.21	0.03
45-49	0.56	0.05	0.35	0.04
50-54	1.29	0.09	0.56	0.06
55-59	2.29	0.12	1.00	0.07
60-64	5.80	0.19	1.79	0.10
65-69	13.32	0.31	3.52	0.15
70-74	26.87	0.49	7.44	0.22
TASSO STANDARDIZZATO	1.94	0.02	0.77	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	1.73	0.08	0.80	0.06
Val D'Aosta	2.28	0.56	0.87	0.34
Lombardia	1.81	0.06	0.69	0.04
Trentino Alto Adige	1.94	0.20	0.85	0.14
Veneto	1.68	0.08	0.60	0.05
Friuli Venezia Giulia	1.90	0.16	0.76	0.10
Liguria	1.68	0.12	0.74	0.09
Emilia Romagna	1.44	0.08	0.60	0.05
Toscana	1.67	0.08	0.72	0.06
Umbria	1.91	0.19	0.62	0.11
Marche	1.80	0.14	0.58	0.08
Lazio	1.60	0.07	0.81	0.05
Abruzzi	2.48	0.18	0.79	0.10
Molise	1.92	0.33	0.85	0.24
Campania	2.73	0.10	0.99	0.06
Puglia	2.32	0.11	0.73	0.06
Basilicata	2.05	0.24	1.08	0.18
Calabria	2.25	0.14	0.84	0.09
Sicilia	2.48	0.10	0.98	0.06
Sardegna	2.41	0.17	0.85	0.11
Nord	1.71	0.03	0.69	0.02
Centro	1.68	0.05	0.73	0.03
Sud e Isole	2.45	0.05	0.90	0.03

CAUSA: 460-519 JCD IX REV.
**DATE: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

POLMONITE**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	0.75	0.17	1.04	0.21
1-4	0.04	0.02	0.08	0.03
5-9	0.03	0.01	0.06	0.02
10-14	0.00	0.00	0.02	0.01
15-19	0.03	0.01	0.03	0.01
20-24	0.04	0.01	0.04	0.01
25-29	0.07	0.02	0.03	0.01
30-34	0.09	0.02	0.05	0.02
35-39	0.13	0.03	0.03	0.01
40-44	0.07	0.02	0.05	0.02
45-49	0.14	0.03	0.09	0.02
50-54	0.16	0.03	0.11	0.02
55-59	0.28	0.04	0.17	0.03
60-64	0.74	0.07	0.34	0.04
65-69	1.31	0.10	0.53	0.06
70-74	3.03	0.17	1.26	0.09
TASSO STANDARDIZZATO	0.26	0.01	0.16	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.29	0.03	0.17	0.03
Val D'Aosta	0.42	0.24	0.28	0.20
Lombardia	0.39	0.03	0.19	0.02
Trentino Alto Adige	0.54	0.11	0.20	0.07
Veneto	0.33	0.04	0.16	0.03
Friuli Venezia Giulia	0.41	0.08	0.22	0.05
Liguria	0.20	0.04	0.21	0.06
Emilia Romagna	0.20	0.03	0.15	0.03
Toscana	0.19	0.03	0.15	0.03
Umbria	0.32	0.09	0.16	0.06
Marche	0.23	0.05	0.17	0.04
Lazio	0.21	0.03	0.15	0.02
Abruzzi	0.25	0.06	0.08	0.03
Molise	0.39	0.16	0.07	0.07
Campania	0.18	0.03	0.12	0.02
Puglia	0.20	0.03	0.12	0.03
Basilicata	0.03	0.03	0.16	0.08
Calabria	0.13	0.04	0.12	0.03
Sicilia	0.18	0.03	0.16	0.03
Sardegna	0.38	0.08	0.24	0.06
Nord	0.32	0.01	0.18	0.01
Centro	0.21	0.02	0.15	0.02
Sud e Isole	0.20	0.01	0.14	0.01

CAUSA: 480-486 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

INFLUENZA

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	0.08	0.06	0.08	0.06
1-4	0.02	0.01	0.04	0.02
5-9	0.01	0.01	0.01	0.01
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.00	0.00	0.00	0.00
20-24	0.01	0.01	0.00	0.00
25-29	0.01	0.01	0.00	0.00
30-34	0.00	0.00	0.00	0.00
35-39	0.01	0.01	0.01	0.01
40-44	0.01	0.01	0.01	0.01
45-49	0.01	0.01	0.01	0.01
50-54	0.02	0.01	0.03	0.01
55-59	0.02	0.01	0.03	0.01
60-64	0.01	0.01	0.01	0.01
65-69	0.07	0.02	0.04	0.02
70-74	0.16	0.04	0.17	0.03
TASSO STANDARDIZZATO	0.02	0.00	0.02	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.02	0.01	0.02	0.01
Val D'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00
Lombardia	0.02	0.01	0.01	0.01
Trentino Alto Adige	0.00	0.00	0.00	0.00
Veneto	0.00	0.00	0.02	0.01
Friuli Venezia Giulia	0.02	0.02	0.01	0.01
Liguria	0.01	0.01	0.00	0.00
Emilia Romagna	0.01	0.01	0.01	0.01
Toscana	0.01	0.01	0.01	0.01
Umbria	0.03	0.02	0.03	0.02
Marche	0.00	0.00	0.02	0.02
Lazio	0.03	0.01	0.02	0.01
Abruzzi	0.00	0.00	0.05	0.03
Molise	0.00	0.00	0.11	0.11
Campania	0.02	0.01	0.03	0.01
Puglia	0.02	0.01	0.02	0.01
Basilicata	0.00	0.00	0.08	0.05
Calabria	0.01	0.01	0.02	0.01
Sicilia	0.04	0.01	0.02	0.01
Sardegna	0.04	0.02	0.04	0.02
Nord	0.01	0.00	0.01	0.00
Centro	0.02	0.01	0.02	0.00
Sud e Isole	0.02	0.00	0.03	0.01

CAUSA: 487 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

BRONCHITE, ENFISEMA ED ASMA**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	0.04	0.04	0.04	0.04
1-4	0.03	0.02	0.04	0.02
5-9	0.00	0.00	0.02	0.01
10-14	0.02	0.01	0.01	0.01
15-19	0.04	0.01	0.02	0.01
20-24	0.04	0.01	0.02	0.01
25-29	0.03	0.01	0.02	0.01
30-34	0.05	0.01	0.02	0.01
35-39	0.06	0.02	0.03	0.01
40-44	0.08	0.02	0.08	0.02
45-49	0.19	0.03	0.12	0.03
50-54	0.58	0.06	0.20	0.03
55-59	1.28	0.09	0.45	0.05
60-64	3.29	0.15	0.82	0.07
65-69	8.48	0.25	1.93	0.11
70-74	17.12	0.40	4.09	0.17
TASSO STANDARDIZZATO	1.13	0.02	0.36	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	1.01	0.06	0.37	0.04
Val D'Aosta	0.92	0.35	0.59	0.27
Lombardia	0.94	0.04	0.28	0.02
Trentino Alto Adige	0.87	0.13	0.41	0.09
Veneto	0.87	0.06	0.24	0.03
Friuli Venezia Giulia	0.93	0.11	0.32	0.06
Liguria	0.85	0.08	0.31	0.05
Emilia Romagna	0.79	0.05	0.28	0.03
Toscana	0.98	0.06	0.38	0.04
Umbria	1.02	0.13	0.35	0.08
Marche	1.08	0.10	0.22	0.05
Lazio	0.95	0.06	0.47	0.04
Abruzzi	1.22	0.12	0.34	0.06
Molise	1.03	0.23	0.24	0.11
Campania	1.87	0.08	0.51	0.04
Puglia	1.62	0.09	0.34	0.04
Basilicata	1.44	0.20	0.37	0.10
Calabria	1.40	0.11	0.41	0.06
Sicilia	1.55	0.08	0.48	0.04
Sardegna	0.95	0.11	0.34	0.07
Nord	0.90	0.02	0.30	0.01
Centro	0.99	0.04	0.39	0.02
Sud e Isole	1.54	0.04	0.42	0.02

CAUSA: 490-493 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**MALATTIE DELL'APPARATO
DIGERENTE**
1994
TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.18	0.04	0.11	0.03
5-9	0.04	0.02	0.03	0.01
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.05	0.02	0.04	0.01
20-24	0.06	0.02	0.04	0.01
25-29	0.25	0.03	0.08	0.02
30-34	0.73	0.06	0.24	0.03
35-39	1.02	0.07	0.32	0.04
40-44	2.04	0.10	0.69	0.06
45-49	2.83	0.12	1.07	0.07
50-54	4.90	0.17	1.73	0.10
55-59	7.39	0.21	2.82	0.13
60-64	11.15	0.27	4.77	0.17
65-69	15.40	0.33	7.47	0.21
70-74	22.84	0.46	12.16	0.29
TASSO STANDARDIZZATO	3.01	0.03	1.53	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	2.84	0.11	1.33	0.07
Val D'Aosta	4.79	0.84	2.33	0.66
Lombardia	3.04	0.08	1.44	0.05
Trentino Alto Adige	3.17	0.26	1.16	0.15
Veneto	3.20	0.12	1.57	0.08
Friuli Venezia Giulia	3.21	0.21	1.64	0.15
Liguria	3.11	0.17	1.55	0.12
Emilia Romagna	2.02	0.09	1.05	0.06
Toscana	2.11	0.10	1.11	0.07
Umbria	2.02	0.20	0.95	0.13
Marche	1.81	0.14	0.61	0.08
Lazio	2.77	0.10	1.31	0.07
Abruzzi	2.78	0.19	1.35	0.13
Molise	3.92	0.46	1.53	0.29
Campania	4.53	0.13	2.92	0.10
Puglia	3.20	0.13	1.87	0.10
Basilicata	3.64	0.34	2.04	0.25
Calabria	3.55	0.18	1.53	0.12
Sicilia	3.10	0.11	1.81	0.08
Sardegna	3.79	0.21	1.34	0.13
Nord	2.89	0.04	1.39	0.03
Centro	2.35	0.06	1.12	0.04
Sud e Isole	3.60	0.06	2.01	0.04

CAUSA: 520-579 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

ULCERA DELLO STOMACO E DEL DUODENO

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	0.00	0.00	0.00	0.00
20-24	0.00	0.00	0.00	0.00
25-29	0.01	0.01	0.00	0.00
30-34	0.01	0.01	0.00	0.00
35-39	0.04	0.01	0.00	0.01
40-44	0.09	0.02	0.02	0.01
45-49	0.10	0.02	0.04	0.01
50-54	0.21	0.03	0.03	0.01
55-59	0.29	0.04	0.11	0.02
60-64	0.52	0.06	0.13	0.03
65-69	0.98	0.08	0.43	0.05
70-74	1.95	0.13	0.72	0.07
TASSO STANDARDIZZATO	0.16	0.01	0.07	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.19	0.03	0.07	0.02
Val D'Aosta	0.30	0.22	0.16	0.16
Lombardia	0.17	0.02	0.07	0.01
Trentino Alto Adige	0.16	0.06	0.03	0.02
Veneto	0.19	0.03	0.11	0.02
Friuli Venezia Giulia	0.17	0.05	0.11	0.03
Liguria	0.23	0.05	0.06	0.02
Emilia Romagna	0.12	0.02	0.06	0.02
Toscana	0.16	0.03	0.02	0.01
Umbria	0.09	0.04	0.08	0.03
Marche	0.05	0.02	0.04	0.02
Lazio	0.17	0.02	0.06	0.01
Abruzzi	0.18	0.05	0.04	0.02
Molise	0.47	0.16	0.07	0.07
Campania	0.15	0.02	0.10	0.02
Puglia	0.12	0.02	0.05	0.02
Basilicata	0.26	0.08	0.11	0.05
Calabria	0.13	0.03	0.05	0.02
Sicilia	0.21	0.03	0.07	0.02
Sardegna	0.14	0.04	0.07	0.03
Nord	0.17	0.01	0.07	0.01
Centro	0.14	0.01	0.05	0.01
Sud e Isole	0.17	0.01	0.07	0.01

CAUSA: 531-533 ICD IX REV.

**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

ERNIA ADDOMINALE

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	0.00	0.00	0.00	0.00
20-24	0.00	0.00	0.00	0.00
25-29	0.00	0.00	0.00	0.00
30-34	0.01	0.01	0.00	0.00
35-39	0.00	0.00	0.00	0.00
40-44	0.01	0.01	0.01	0.01
45-49	0.02	0.01	0.01	0.01
50-54	0.01	0.01	0.02	0.01
55-59	0.04	0.01	0.02	0.01
60-64	0.04	0.02	0.05	0.02
65-69	0.14	0.03	0.15	0.03
70-74	0.32	0.05	0.26	0.04
TASSO STANDARDIZZATO	0.02	0.00	0.02	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.03	0.01	0.02	0.01
Val D'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00
Lombardia	0.01	0.00	0.01	0.00
Trentino Alto Adige	0.02	0.02	0.01	0.01
Veneto	0.03	0.01	0.01	0.01
Friuli Venezia Giulia	0.03	0.02	0.03	0.02
Liguria	0.02	0.01	0.02	0.01
Emilia Romagna	0.02	0.01	0.02	0.01
Toscana	0.01	0.00	0.02	0.01
Umbria	0.01	0.01	0.03	0.02
Marche	0.01	0.01	0.00	0.00
Lazio	0.04	0.01	0.04	0.01
Abruzzi	0.01	0.01	0.06	0.03
Molise	0.07	0.05	0.00	0.00
Campania	0.04	0.01	0.03	0.01
Puglia	0.02	0.01	0.05	0.02
Basilicata	0.00	0.00	0.03	0.03
Calabria	0.02	0.01	0.01	0.01
Sicilia	0.02	0.01	0.03	0.01
Sardegna	0.02	0.02	0.02	0.02
Nord	0.02	0.00	0.02	0.00
Centro	0.02	0.01	0.03	0.01
Sud e Isole	0.02	0.00	0.03	0.01

CAUSA: 550-553 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

CIRROSI EPATICA**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.01	0.01	0.01	0.01
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.01	0.01	0.02	0.01
20-24	0.04	0.01	0.01	0.01
25-29	0.17	0.03	0.04	0.01
30-34	0.55	0.05	0.16	0.03
35-39	0.82	0.06	0.21	0.03
40-44	1.55	0.09	0.50	0.05
45-49	2.22	0.11	0.78	0.06
50-54	4.06	0.15	1.32	0.09
55-59	5.87	0.19	2.13	0.11
60-64	8.56	0.23	3.55	0.14
65-69	10.36	0.27	5.03	0.17
70-74	13.49	0.35	7.36	0.22
TASSO STANDARDIZZATO	2.15	0.03	1.04	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	1.92	0.09	0.78	0.05
Val D'Aosta	3.75	0.75	1.37	0.46
Lombardia	2.19	0.07	0.98	0.04
Trentino Alto Adige	2.42	0.23	0.85	0.13
Veneto	2.24	0.10	1.14	0.07
Friuli Venezia Giulia	2.14	0.17	1.12	0.12
Liguria	1.95	0.14	0.96	0.09
Emilia Romagna	1.33	0.07	0.69	0.05
Toscana	1.32	0.08	0.71	0.06
Umbria	1.43	0.17	0.57	0.10
Marche	1.17	0.11	0.28	0.06
Lazio	1.75	0.08	0.74	0.05
Abruzzi	1.87	0.16	0.90	0.11
Molise	2.76	0.40	0.97	0.22
Campania	3.66	0.12	2.32	0.09
Puglia	2.52	0.11	1.38	0.08
Basilicata	2.86	0.30	1.25	0.19
Calabria	2.89	0.17	1.05	0.10
Sicilia	2.26	0.09	1.25	0.07
Sardegna	2.85	0.19	0.83	0.10
Nord	2.00	0.04	0.93	0.02
Centro	1.50	0.05	0.65	0.03
Sud e Isole	2.78	0.05	1.47	0.04

CAUSA: 571 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

COLELITIASI

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	0.01	0.01	0.00	0.00
20-24	0.00	0.00	0.00	0.00
25-29	0.00	0.00	0.00	0.00
30-34	0.00	0.00	0.00	0.00
35-39	0.00	0.00	0.00	0.00
40-44	0.01	0.01	0.01	0.01
45-49	0.02	0.01	0.01	0.01
50-54	0.02	0.01	0.04	0.01
55-59	0.05	0.02	0.03	0.01
60-64	0.08	0.02	0.07	0.02
65-69	0.16	0.03	0.13	0.03
70-74	0.36	0.06	0.25	0.04
TASSO STANDARDIZZATO	0.03	0.00	0.02	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.02	0.01	0.02	0.01
Vai D'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00
Lombardia	0.02	0.01	0.02	0.01
Trentino Alto Adige	0.02	0.02	0.02	0.02
Veneto	0.02	0.01	0.01	0.01
Friuli Venezia Giulia	0.05	0.03	0.02	0.02
Liguria	0.05	0.02	0.02	0.01
Emilia Romagna	0.01	0.01	0.01	0.00
Toscana	0.05	0.01	0.02	0.01
Umbria	0.00	0.00	0.00	0.00
Marche	0.01	0.01	0.01	0.01
Lazio	0.03	0.01	0.03	0.01
Abruzzi	0.02	0.01	0.07	0.03
Molise	0.00	0.00	0.00	0.00
Campania	0.03	0.01	0.03	0.01
Puglia	0.03	0.01	0.03	0.01
Basilicata	0.03	0.03	0.09	0.05
Calabria	0.02	0.01	0.02	0.01
Sicilia	0.03	0.01	0.04	0.01
Sardegna	0.01	0.01	0.07	0.03
Nord	0.02	0.00	0.02	0.00
Centro	0.03	0.01	0.02	0.01
Sud e Isole	0.03	0.01	0.04	0.01

CAUSA: 574 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**MALATTIE DELL'APPARATO
GENITO-URINARIO**

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.08	0.02	0.03	0.02
5-9	0.01	0.01	0.00	0.00
10-14	0.01	0.01	0.01	0.01
15-19	0.00	0.00	0.01	0.01
20-24	0.00	0.00	0.01	0.01
25-29	0.02	0.01	0.03	0.01
30-34	0.06	0.02	0.05	0.01
35-39	0.09	0.02	0.10	0.02
40-44	0.10	0.02	0.08	0.02
45-49	0.22	0.03	0.19	0.03
50-54	0.35	0.05	0.28	0.04
55-59	0.75	0.07	0.47	0.05
60-64	1.23	0.09	0.87	0.07
65-69	2.41	0.13	1.50	0.10
70-74	4.97	0.21	2.62	0.13
TASSO STANDARDIZZATO	0.40	0.01	0.30	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.35	0.04	0.25	0.03
Val D'Aosta	0.14	0.14	0.00	0.00
Lombardia	0.41	0.03	0.29	0.02
Trentino Alto Adige	0.41	0.09	0.34	0.08
Veneto	0.38	0.04	0.22	0.03
Friuli Venezia Giulia	0.32	0.06	0.19	0.05
Liguria	0.44	0.06	0.27	0.06
Emilia Romagna	0.27	0.03	0.21	0.03
Toscana	0.27	0.03	0.27	0.03
Umbria	0.35	0.08	0.16	0.05
Marche	0.21	0.05	0.11	0.03
Lazio	0.35	0.03	0.26	0.03
Abruzzi	0.43	0.08	0.33	0.06
Molise	0.54	0.18	0.27	0.11
Campania	0.71	0.05	0.50	0.04
Puglia	0.44	0.05	0.38	0.04
Basilicata	0.47	0.11	0.24	0.08
Calabria	0.29	0.05	0.25	0.05
Sicilia	0.56	0.05	0.49	0.04
Sardegna	0.37	0.06	0.39	0.07
Nord	0.37	0.02	0.25	0.01
Centro	0.30	0.02	0.24	0.02
Sud e Isole	0.52	0.02	0.42	0.02

CAUSA: 580-629 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

NEFRITE, NEFROSI

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.06	0.02	0.03	0.02
5-9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.01	0.01	0.01	0.01
15-19	0.00	0.00	0.01	0.01
20-24	0.00	0.00	0.00	0.00
25-29	0.02	0.01	0.01	0.01
30-34	0.06	0.02	0.04	0.01
35-39	0.06	0.02	0.08	0.02
40-44	0.10	0.02	0.07	0.02
45-49	0.20	0.03	0.17	0.03
50-54	0.34	0.04	0.25	0.04
55-59	0.65	0.06	0.38	0.05
60-64	1.07	0.08	0.76	0.07
65-69	2.07	0.12	1.32	0.09
70-74	4.27	0.20	2.29	0.12
TASSO STANDARDIZZATO	0.35	0.01	0.26	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.29	0.04	0.19	0.03
Val D'Aosta	0.14	0.14	0.00	0.00
Lombardia	0.36	0.03	0.26	0.02
Trentino Alto Adige	0.35	0.08	0.30	0.08
Veneto	0.31	0.04	0.19	0.03
Friuli Venezia Giulia	0.28	0.06	0.16	0.05
Liguria	0.38	0.06	0.24	0.05
Emilia Romagna	0.22	0.03	0.17	0.02
Toscana	0.24	0.03	0.22	0.03
Umbria	0.25	0.07	0.13	0.05
Marche	0.16	0.04	0.08	0.03
Lazio	0.30	0.03	0.20	0.03
Abruzzi	0.36	0.07	0.31	0.06
Molise	0.50	0.18	0.27	0.11
Campania	0.65	0.05	0.45	0.04
Puglia	0.38	0.04	0.32	0.04
Basilicata	0.41	0.11	0.22	0.08
Calabria	0.22	0.04	0.24	0.05
Sicilia	0.51	0.04	0.44	0.04
Sardegna	0.36	0.06	0.37	0.07
Nord	0.31	0.01	0.22	0.01
Centro	0.25	0.02	0.19	0.02
Sud e Isole	0.46	0.02	0.37	0.02

CAUSA: 580-589 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

IPERPLASIA DELLA PROSTATA

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.00	0.00		
5-9	0.00	0.00		
10-14	0.00	0.00		
15-19	0.00	0.00		
20-24	0.00	0.00		
25-29	0.00	0.00		
30-34	0.00	0.00		
35-39	0.00	0.00		
40-44	0.00	0.00		
45-49	0.00	0.00		
50-54	0.00	0.00		
55-59	0.01	0.01		
60-64	0.07	0.02		
65-69	0.15	0.03		
70-74	0.30	0.05		
TASSO STANDARDIZZATO	0.02	0.00		

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.01	0.01		
Val D'Aosta	0.00	0.00		
Lombardia	0.01	0.00		
Trentino Alto Adige	0.02	0.02		
Veneto	0.03	0.01		
Friuli Venezia Giulia	0.01	0.01		
Liguria	0.02	0.01		
Emilia Romagna	0.02	0.01		
Toscana	0.01	0.01		
Umbria	0.00	0.00		
Marche	0.03	0.02		
Lazio	0.03	0.01		
Abruzzi	0.04	0.02		
Molise	0.00	0.00		
Campania	0.02	0.01		
Puglia	0.03	0.01		
Basilicata	0.02	0.02		
Calabria	0.03	0.02		
Sicilia	0.03	0.01		
Sardegna	0.00	0.00		
Nord	0.02	0.00		
Centro	0.02	0.01		
Sud e Isole	0.02	0.00		

CAUSA: 600 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4			0.00	0.00
5-9			0.00	0.00
10-14			0.00	0.00
15-19			0.00	0.00
20-24			0.00	0.00
25-29			0.03	0.01
30-34			0.03	0.01
35-39			0.02	0.01
40-44			0.01	0.01
45-49			0.00	0.00
50-54			0.00	0.00
55-59			0.00	0.00
60-64			0.00	0.00
65-69			0.00	0.00
70-74			0.00	0.00
TASSO STANDARDIZZATO			0.01	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte			0.01	0.01
Val D'Aosta			0.00	0.00
Lombardia			0.00	0.00
Trentino Alto Adige			0.00	0.00
Veneto			0.01	0.01
Friuli Venezia Giulia			0.00	0.00
Liguria			0.00	0.00
Emilia Romagna			0.01	0.01
Toscana			0.00	0.00
Umbria			0.00	0.00
Marche			0.00	0.00
Lazio			0.00	0.00
Abruzzi			0.01	0.01
Molise			0.00	0.00
Campania			0.00	0.00
Puglia			0.00	0.00
Basilicata			0.03	0.03
Calabria			0.02	0.01
Sicilia			0.02	0.01
Sardegna			0.00	0.00
Nord			0.00	0.00
Centro			0.00	0.00
Sud e Isole			0.01	0.00

CAUSA: 630-676 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

**M. DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE
E DEL TESSUTO CONNETTIVO**

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.01	0.01	0.02	0.01
5-9	0.01	0.01	0.01	0.01
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.00	0.00	0.03	0.01
20-24	0.00	0.00	0.04	0.01
25-29	0.00	0.00	0.02	0.01
30-34	0.02	0.01	0.03	0.01
35-39	0.01	0.01	0.07	0.02
40-44	0.04	0.02	0.08	0.02
45-49	0.05	0.02	0.07	0.02
50-54	0.08	0.02	0.16	0.03
55-59	0.11	0.03	0.23	0.04
60-64	0.19	0.03	0.37	0.05
65-69	0.31	0.05	0.75	0.07
70-74	0.72	0.08	1.29	0.09
TASSO STANDARDIZZATO	0.06	0.00	0.15	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.05	0.01	0.14	0.02
Val D'Aosta	0.11	0.11	0.48	0.24
Lombardia	0.05	0.01	0.18	0.02
Trentino Alto Adige	0.14	0.05	0.10	0.05
Veneto	0.07	0.02	0.15	0.02
Friuli Venezia Giulia	0.06	0.03	0.12	0.04
Liguria	0.10	0.03	0.16	0.04
Emilia Romagna	0.08	0.02	0.20	0.03
Toscana	0.05	0.02	0.18	0.03
Umbria	0.03	0.02	0.09	0.04
Marche	0.04	0.02	0.13	0.04
Lazio	0.04	0.01	0.12	0.02
Abruzzi	0.09	0.03	0.20	0.05
Molise	0.05	0.05	0.28	0.12
Campania	0.07	0.02	0.12	0.02
Puglia	0.08	0.02	0.14	0.03
Basilicata	0.06	0.05	0.14	0.07
Calabria	0.05	0.02	0.16	0.04
Sicilia	0.07	0.02	0.14	0.02
Sardegna	0.05	0.03	0.15	0.04
Nord	0.07	0.01	0.17	0.01
Centro	0.05	0.01	0.14	0.01
Sud e Isole	0.07	0.01	0.15	0.01

CAUSA: 710-739 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

MALFORMAZIONI CONGENITE**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	19.57	0.87	17.36	0.85
1-1	1.08	0.19	0.66	0.16
2-2	0.63	0.15	0.40	0.12
3-3	0.36	0.11	0.26	0.10
4-4	0.11	0.06	0.44	0.13
5-9	0.08	0.02	0.10	0.03
10-14	0.11	0.03	0.11	0.03
15-19	0.16	0.03	0.08	0.02
20-24	0.11	0.02	0.05	0.02
25-29	0.05	0.02	0.08	0.02
30-34	0.08	0.02	0.08	0.02
35-39	0.08	0.02	0.09	0.02
40-44	0.08	0.02	0.10	0.02
45-49	0.06	0.02	0.08	0.02
50-54	0.11	0.03	0.10	0.02
55-59	0.11	0.03	0.11	0.02
60-64	0.14	0.03	0.14	0.03
65-69	0.19	0.04	0.10	0.02
70-74	0.28	0.05	0.17	0.03
TASSO STANDARDIZZATO	0.48	0.02	0.39	0.02

TASSI STANDARDIZZATI (ETÀ' 0)

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD*	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	12.9	2.9	12.2	2.9
Val D'Aosta	44.2	31.2	0.0	0.0
Lombardia	20.0	2.4	14.3	2.1
Trentino Alto Adige	17.7	6.3	11.5	5.1
Veneto	17.9	3.2	11.8	2.6
Friuli Venezia Giulia	7.7	4.4	10.8	5.4
Liguria	17.5	5.8	10.4	4.7
Emilia Romagna	14.7	3.4	20.0	4.1
Toscana	18.5	3.9	8.8	2.8
Umbria	13.4	6.7	10.8	6.2
Marche	18.4	5.8	17.7	5.9
Lazio	14.7	2.5	18.1	2.9
Abruzzi	12.5	4.7	34.3	8.1
Molise	33.3	14.9	28.4	14.2
Campania	24.5	2.6	20.6	2.5
Puglia	20.0	3.0	14.1	2.6
Basilicata	26.2	9.2	10.6	6.1
Calabria	29.4	5.1	27.7	5.1
Sicilia	21.9	2.7	25.6	3.0
Sardegna	22.4	5.6	11.9	4.2
Nord	17.1	1.3	13.7	1.2
Centro	16.1	1.9	15.0	1.9
Sud e Isole	22.9	1.4	21.3	1.4

CAUSA: 740-759 ICD IX REV.

DATI: ISTAT

ELABORAZIONI: LEB-ISS

ALCUNE CAUSE DI MORTALITA' PERINATALE

1994
TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETA'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	45.0	1.32	35.8	1.21
TASSO STANDARDIZZATO	45.0	1.33	35.8	1.22

TASSI STANDARDIZZATI (ETA' 0)

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	34.2	4.7	35.2	4.9
Val D'Aosta	22.1	22.1	0.0	0.0
Lombardia	27.0	2.8	24.4	2.7
Trentino Alto Adige	28.8	8.0	32.2	8.6
Veneto	25.8	3.8	24.2	3.8
Friuli Venezia Giulia	18.0	6.8	13.5	6.1
Liguria	31.2	7.8	39.7	9.1
Emilia Romagna	35.6	5.2	25.8	4.6
Toscana	45.4	6.2	31.8	5.3
Umbria	36.9	11.1	32.3	10.7
Marche	47.8	9.4	43.4	9.2
Lazio	39.5	4.1	26.5	3.5
Abruzzi	62.5	10.5	57.1	10.4
Molise	53.3	18.8	7.1	7.1
Campania	65.8	4.3	51.7	3.9
Puglia	57.3	5.1	45.4	4.7
Basilicata	52.4	13.1	38.7	11.7
Calabria	50.7	6.7	48.7	6.8
Sicilia	62.0	4.6	43.7	4.0
Sardegna	39.2	7.4	14.9	4.7
Nord	29.0	1.7	26.9	1.7
Centro	42.0	3.1	30.4	2.7
Sud e Isole	59.4	2.3	45.2	2.0

CAUSA: 760-779 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

**SINTOMI E STATI MORBOSI
MAL DEFINITI**

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	2.48	0.31	2.17	0.30
1-4	0.13	0.03	0.10	0.03
5-9	0.04	0.02	0.03	0.01
10-14	0.05	0.02	0.03	0.01
15-19	0.13	0.03	0.08	0.02
20-24	0.29	0.04	0.07	0.02
25-29	0.50	0.05	0.10	0.02
30-34	0.43	0.04	0.06	0.02
35-39	0.32	0.04	0.07	0.02
40-44	0.29	0.04	0.09	0.02
45-49	0.40	0.05	0.15	0.03
50-54	0.55	0.06	0.16	0.03
55-59	0.62	0.06	0.23	0.04
60-64	0.94	0.08	0.40	0.05
65-69	1.55	0.11	0.79	0.07
70-74	2.47	0.15	1.43	0.10
TASSO STANDARDIZZATO	0.47	0.01	0.22	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.36	0.04	0.20	0.03
Val D'Aosta	0.61	0.31	0.64	0.42
Lombardia	0.26	0.03	0.17	0.02
Trentino Alto Adige	0.27	0.08	0.13	0.05
Veneto	0.40	0.05	0.19	0.03
Friuli Venezia Giulia	0.36	0.09	0.45	0.11
Liguria	1.84	0.14	0.59	0.08
Emilia Romagna	0.43	0.05	0.21	0.04
Toscana	0.23	0.04	0.17	0.04
Umbria	0.15	0.07	0.03	0.03
Marche	0.17	0.05	0.02	0.02
Lazio	0.27	0.03	0.18	0.03
Abruzzi	0.24	0.06	0.15	0.05
Molise	0.28	0.14	0.06	0.06
Campania	1.40	0.07	0.48	0.04
Puglia	0.17	0.03	0.15	0.03
Basilicata	0.30	0.10	0.07	0.05
Calabria	0.65	0.08	0.30	0.05
Sicilia	0.56	0.05	0.27	0.03
Sardegna	0.25	0.06	0.09	0.03
Nord	0.44	0.02	0.23	0.01
Centro	0.24	0.02	0.14	0.02
Sud e Isole	0.66	0.03	0.27	0.02

CAUSA: 780-799 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

**SINTOMI E STATI MORBOSI
MAL DEFINITI**

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-0	2.48	0.31	2.17	0.30
1-4	0.13	0.03	0.10	0.03
5-9	0.04	0.02	0.03	0.01
10-14	0.05	0.02	0.03	0.01
15-19	0.13	0.03	0.08	0.02
20-24	0.29	0.04	0.07	0.02
25-29	0.50	0.05	0.10	0.02
30-34	0.43	0.04	0.06	0.02
35-39	0.32	0.04	0.07	0.02
40-44	0.29	0.04	0.09	0.02
45-49	0.40	0.05	0.15	0.03
50-54	0.55	0.06	0.16	0.03
55-59	0.62	0.06	0.23	0.04
60-64	0.94	0.08	0.40	0.05
65-69	1.55	0.11	0.79	0.07
70-74	2.47	0.15	1.43	0.10
TASSO STANDARDIZZATO	0.47	0.01	0.22	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.36	0.04	0.20	0.03
Val D'Aosta	0.61	0.31	0.64	0.42
Lombardia	0.26	0.03	0.17	0.02
Trentino Alto Adige	0.27	0.08	0.13	0.05
Veneto	0.40	0.05	0.19	0.03
Friuli Venezia Giulia	0.36	0.09	0.45	0.11
Liguria	1.84	0.14	0.59	0.08
Emilia Romagna	0.43	0.05	0.21	0.04
Toscana	0.23	0.04	0.17	0.04
Umbria	0.15	0.07	0.03	0.03
Marche	0.17	0.05	0.02	0.02
Lazio	0.27	0.03	0.18	0.03
Abruzzi	0.24	0.06	0.15	0.05
Molise	0.28	0.14	0.06	0.06
Campania	1.40	0.07	0.48	0.04
Puglia	0.17	0.03	0.15	0.03
Basilicata	0.30	0.10	0.07	0.05
Calabria	0.65	0.08	0.30	0.05
Sicilia	0.56	0.05	0.27	0.03
Sardegna	0.25	0.06	0.09	0.03
Nord	0.44	0.02	0.23	0.01
Centro	0.24	0.02	0.14	0.02
Sud e Isole	0.66	0.03	0.27	0.02

CAUSA: 780-799 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

ACCIDENTI, AVVELENAMENTI E TRAUMATISMI

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.64	0.07	0.54	0.06
5-9	0.55	0.06	0.33	0.05
10-14	0.88	0.07	0.47	0.06
15-19	5.20	0.16	1.15	0.08
20-24	6.17	0.17	1.20	0.07
25-29	5.30	0.15	1.07	0.07
30-34	4.81	0.15	1.11	0.07
35-39	4.39	0.15	0.97	0.07
40-44	4.40	0.15	0.94	0.07
45-49	4.38	0.15	1.22	0.08
50-54	5.24	0.17	1.48	0.09
55-59	5.62	0.18	1.69	0.10
60-64	6.43	0.20	2.18	0.11
65-69	8.37	0.25	2.92	0.13
70-74	11.20	0.32	5.20	0.19
TASSO STANDARDIZZATO	4.27	0.04	1.29	0.02

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	5.00	0.15	1.70	0.09
Val D'Aosta	9.11	1.29	2.41	0.68
Lombardia	4.08	0.10	1.30	0.05
Trentino Alto Adige	5.62	0.36	1.45	0.18
Veneto	5.29	0.16	1.51	0.08
Friuli Venezia Giulia	5.13	0.29	1.69	0.16
Liguria	3.38	0.21	1.09	0.12
Emilia Romagna	4.90	0.16	1.75	0.10
Toscana	3.83	0.15	1.22	0.08
Umbria	4.88	0.34	1.34	0.18
Marche	4.05	0.24	1.33	0.13
Lazio	3.60	0.12	1.24	0.07
Abruzzi	4.10	0.25	1.16	0.13
Molise	4.47	0.54	1.38	0.29
Campania	3.17	0.11	0.88	0.06
Puglia	4.35	0.15	1.17	0.08
Basilicata	4.14	0.37	1.07	0.18
Calabria	4.25	0.20	1.23	0.11
Sicilia	4.07	0.13	1.03	0.06
Sardegna	5.63	0.26	1.43	0.13
Nord	4.65	0.06	1.49	0.03
Centro	3.83	0.08	1.25	0.05
Sud e Isole	4.04	0.06	1.08	0.03

CAUSA: 800-999 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

FRATTURE**1994****TASSI SPECIFICI**

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.15	0.03	0.18	0.04
5-9	0.14	0.03	0.14	0.03
10-14	0.32	0.05	0.16	0.03
15-19	1.89	0.10	0.48	0.05
20-24	2.22	0.10	0.46	0.05
25-29	1.67	0.08	0.34	0.04
30-34	1.46	0.08	0.31	0.04
35-39	1.23	0.08	0.27	0.04
40-44	1.27	0.08	0.19	0.03
45-49	1.21	0.08	0.31	0.04
50-54	1.49	0.09	0.36	0.04
55-59	1.72	0.10	0.46	0.05
60-64	1.91	0.11	0.70	0.06
65-69	2.53	0.14	1.24	0.09
70-74	4.39	0.20	2.67	0.13
TASSO STANDARDIZZATO	1.35	0.02	0.45	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	1.28	0.08	0.44	0.04
Val D'Aosta	1.42	0.48	0.94	0.43
Lombardia	1.38	0.06	0.45	0.03
Trentino Alto Adige	1.95	0.21	0.54	0.11
Veneto	1.64	0.09	0.43	0.04
Friuli Venezia Giulia	1.65	0.16	0.47	0.08
Liguria	0.98	0.10	0.32	0.06
Emilia Romagna	1.48	0.09	0.58	0.06
Toscana	1.25	0.08	0.58	0.06
Umbria	1.93	0.22	0.49	0.10
Marche	1.40	0.14	0.46	0.08
Lazio	1.30	0.07	0.64	0.05
Abruzzi	1.09	0.13	0.23	0.06
Molise	1.45	0.31	0.55	0.18
Campania	0.96	0.06	0.36	0.04
Puglia	1.49	0.09	0.39	0.04
Basilicata	1.25	0.21	0.33	0.10
Calabria	1.32	0.11	0.39	0.06
Sicilia	1.26	0.07	0.38	0.04
Sardegna	1.75	0.14	0.47	0.08
Nord	1.43	0.03	0.46	0.02
Centro	1.35	0.05	0.58	0.03
Sud e Isole	1.26	0.04	0.37	0.02

CAUSA: 800-829 ICD IX REV.**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

TRAUMATISMI

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.22	0.04	0.19	0.04
5-9	0.31	0.05	0.11	0.03
10-14	0.30	0.04	0.19	0.04
15-19	2.60	0.12	0.53	0.05
20-24	2.75	0.11	0.51	0.05
25-29	2.17	0.10	0.46	0.04
30-34	1.90	0.09	0.44	0.04
35-39	1.78	0.10	0.39	0.04
40-44	1.72	0.10	0.35	0.04
45-49	1.72	0.10	0.54	0.05
50-54	2.03	0.11	0.53	0.05
55-59	2.20	0.11	0.74	0.06
60-64	2.67	0.13	0.85	0.07
65-69	3.55	0.16	1.02	0.08
70-74	4.49	0.20	1.54	0.10
TASSO STANDARDIZZATO	1.78	0.02	0.49	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	2.23	0.10	0.77	0.06
Val D'Aosta	2.91	0.79	0.94	0.45
Lombardia	1.69	0.06	0.55	0.04
Trentino Alto Adige	1.97	0.21	0.33	0.09
Veneto	2.30	0.10	0.67	0.06
Friuli Venezia Giulia	2.10	0.18	0.58	0.10
Liguria	1.35	0.13	0.56	0.09
Emilia Romagna	2.19	0.11	0.71	0.06
Toscana	1.63	0.10	0.39	0.05
Umbria	1.55	0.19	0.56	0.12
Marche	1.61	0.15	0.47	0.08
Lazio	1.37	0.07	0.29	0.03
Abruzzi	2.01	0.18	0.53	0.09
Molise	1.94	0.36	0.47	0.16
Campania	1.36	0.07	0.31	0.03
Puglia	1.79	0.09	0.47	0.05
Basilicata	1.71	0.24	0.41	0.11
Calabria	1.88	0.14	0.53	0.07
Sicilia	1.70	0.08	0.35	0.04
Sardegna	1.96	0.15	0.49	0.08
Nord	1.97	0.04	0.63	0.02
Centro	1.50	0.05	0.37	0.03
Sud e Isole	1.69	0.04	0.41	0.02

CAUSA: 850-869 950-957 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

USTIONI

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.02	0.01	0.01	0.01
5-9	0.01	0.01	0.01	0.01
10-14	0.03	0.01	0.03	0.01
15-19	0.05	0.02	0.01	0.01
20-24	0.10	0.02	0.02	0.01
25-29	0.09	0.02	0.02	0.01
30-34	0.08	0.02	0.02	0.01
35-39	0.08	0.02	0.03	0.01
40-44	0.13	0.03	0.07	0.02
45-49	0.07	0.02	0.06	0.02
50-54	0.13	0.03	0.04	0.02
55-59	0.10	0.02	0.03	0.01
60-64	0.12	0.03	0.04	0.02
65-69	0.10	0.03	0.05	0.02
70-74	0.18	0.04	0.12	0.03
TASSO STANDARDIZZATO	0.08	0.01	0.04	0.00

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.08	0.02	0.04	0.01
Val D'Aosta	0.37	0.22	0.00	0.00
Lombardia	0.05	0.01	0.01	0.01
Trentino Alto Adige	0.06	0.04	0.02	0.02
Veneto	0.09	0.02	0.03	0.01
Friuli Venezia Giulia	0.13	0.05	0.05	0.03
Liguria	0.15	0.04	0.01	0.01
Emilia Romagna	0.05	0.02	0.08	0.02
Toscana	0.06	0.02	0.01	0.01
Umbria	0.04	0.03	0.04	0.03
Marche	0.04	0.02	0.02	0.02
Lazio	0.10	0.02	0.06	0.02
Abruzzi	0.05	0.03	0.02	0.02
Molise	0.18	0.10	0.00	0.00
Campania	0.07	0.02	0.02	0.01
Puglia	0.08	0.02	0.06	0.02
Basilicata	0.20	0.08	0.07	0.05
Calabria	0.04	0.02	0.02	0.02
Sicilia	0.09	0.02	0.05	0.01
Sardegna	0.11	0.04	0.04	0.02
Nord	0.07	0.01	0.03	0.01
Centro	0.07	0.01	0.04	0.01
Sud e Isole	0.08	0.01	0.04	0.01

CAUSA: 940-949 ICD IX REV.

DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS

AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI

1994

TASSI SPECIFICI

CLASSI DI ETÀ	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
0-4	0.01	0.01	0.00	0.00
5-9	0.00	0.00	0.02	0.01
10-14	0.01	0.01	0.00	0.00
15-19	0.04	0.01	0.03	0.01
20-24	0.23	0.03	0.05	0.02
25-29	0.32	0.04	0.07	0.02
30-34	0.36	0.04	0.11	0.02
35-39	0.30	0.04	0.10	0.02
40-44	0.31	0.04	0.12	0.02
45-49	0.25	0.04	0.10	0.02
50-54	0.32	0.04	0.13	0.03
55-59	0.24	0.04	0.12	0.03
60-64	0.21	0.04	0.10	0.02
65-69	0.28	0.04	0.13	0.03
70-74	0.24	0.05	0.16	0.03
TASSO STANDARDIZZATO	0.19	0.01	0.08	0.01

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERRORE STANDARD	TASSO	ERRORE STANDARD
Piemonte	0.38	0.04	0.13	0.03
Val D'Aosta	0.91	0.37	0.10	0.10
Lombardia	0.20	0.02	0.07	0.01
Trentino Alto Adige	0.53	0.11	0.18	0.06
Veneto	0.20	0.03	0.09	0.02
Friuli Venezia Giulia	0.32	0.07	0.19	0.06
Liguria	0.16	0.04	0.04	0.02
Emilia Romagna	0.27	0.04	0.08	0.02
Toscana	0.21	0.03	0.06	0.02
Umbria	0.10	0.05	0.04	0.03
Marche	0.22	0.05	0.07	0.03
Lazio	0.14	0.02	0.06	0.02
Abruzzi	0.13	0.04	0.08	0.03
Molise	0.16	0.09	0.12	0.09
Campania	0.07	0.02	0.04	0.01
Puglia	0.17	0.03	0.06	0.02
Basilicata	0.06	0.04	0.03	0.03
Calabria	0.09	0.03	0.07	0.03
Sicilia	0.11	0.02	0.05	0.01
Sardegna	0.14	0.04	0.12	0.04
Nord	0.26	0.01	0.09	0.01
Centro	0.17	0.02	0.06	0.01
Sud e Isole	0.11	0.01	0.06	0.01

CAUSA: 960-989 ICD IX REV.
**DATI: ISTAT
ELABORAZIONI: LEB-ISS**

APPENDICE

Numero assoluto di decessi nel 1994 per le cause considerate.

Causa	Maschi			Femmine		
	<75	>75	Tot.	<75	>75	Tot.
tutte le cause	150246	134649	284895	83709	185407	269116
malattie infettive e parassitarie	746	462	1208	403	528	931
malattie infettive intestinali	20	23	43	13	44	57
tubercolosi	224	132	356	90	92	182
tumori	59207	31914	91121	35676	29082	64758
tumori maligni - stomaco	4475	3117	7592	2273	3326	5599
tumori maligni - intestino crasso eccetto il retto	4002	3077	7079	3238	3953	7191
tumori maligni - retto, g. rettosigmoidea, ano	1538	1146	2684	960	1210	2170
tumori maligni - trachea, bronchi, polmoni	19282	6651	25933	3086	1866	4952
tumori maligni - mammella	55	28	83	7754	3589	11343
tumori maligni - utero	0	0	0	1864	1290	3154
leucemia	1751	1074	2825	1284	1048	2332
diabete mellito	2993	2952	5945	3260	7050	10310
anemia	225	359	584	209	570	779
disturbi psichici	1480	1475	2955	600	3002	3602
malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	2433	2581	5014	2100	3823	5923
malattie del sistema circolatorio	44805	65659	110464	24419	106819	131238
cardiopatie reumatiche croniche	349	164	513	596	498	1094

(continua)

Causa	Maschi			Femmine		
	<75	>75	Tot.	<75	>75	Tot.
ipertensione	2153	4038	6191	2070	8983	11053
malattie ischemiche del cuore	21216	19205	40421	7919	25239	33158
infarto miocardico acuto	13799	8510	22309	4911	9885	14796
malattie cerebrovascolari	9574	20749	30323	7406	36015	43421
arteriosclerosi	575	3012	3587	271	5501	5772
malattie dell'apparato respiratorio	6679	13722	20401	2558	10724	13282
polmonite	844	2434	3278	494	3204	3698
influenza	52	150	202	56	322	378
bronchite, enfisema ed asma	3955	8658	12613	1253	4908	6161
malattie dell'apparato digerente	9806	5771	15577	5173	7704	12877
ulcera dello stomaco e del duodeno	560	806	1366	235	821	1056
ernia addominale	76	211	287	84	220	304
cirrosi epatica	6950	2070	9020	3488	2249	5737
colecistiti	92	145	237	86	344	430
malattie dell'apparato genito-urinario	1361	2349	3710	1016	2509	3525
nefrite e nefrosi	1179	1740	2919	881	2125	3006
iperplasia della prostata	67	269	336	0	0	0
complicazioni della gravidanza del parto e del puerperio	0	0	0	18	0	18

(continua)

Causa	Maschi			Femmine		
	<75	>75	Tot.	<75	>75	Tot.
malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo	211	270	481	520	871	1391
malformazioni congenite	832	72	904	706	88	794
alcune cause di mortalità perinatale	1145	0	1145	858	0	858
sintomi e stati morbosi mal definiti	1413	2535	3948	676	5050	5726
incidenti, avvelenamenti traumatismi	12730	4073	16803	3949	6554	10503
fratture	4045	2345	6390	1419	5102	6521
traumatismi	5276	1036	6312	1495	755	2250
ustioni	228	67	295	103	90	193
avvelenamenti ed effetti tossici	574	83	657	229	73	302

*Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità
e Responsabile scientifico: Giuseppe Benagiano*

Direttore responsabile: Vilma Alberani

*Stampato dal Servizio per le attività editoriali
dell'Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA*

*La riproduzione parziale o totale dei Rapporti e Congressi ISTISAN
deve essere preventivamente autorizzata.*

Reg. Stampa - Tribunale di Roma n. 131/88 del 1° marzo 1988

Roma, giugno 1998 (n. 2) 4° Suppl.

*La responsabilità dei dati scientifici e tecnici
pubblicati nei Rapporti e Congressi ISTISAN è dei singoli autori*