



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 173

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 26 agosto 2026

28 agosto 2026

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. Nell'ultimo mese di campionamento disponibile (luglio 2026) si evidenzia la co-circolazione di diverse varianti attenzionate a livello internazionale.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 26/08/2026 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,5% (310 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,5% al 19/08/2026) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,1% (13 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,1% al 19/08/2026) (tab.2, fig.2).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati al 26 agosto 2026 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 11/08/2026, è pari a 1,66 (0,80-2,84), in aumento rispetto alla settimana precedente ($R_t=1,09$ (0,40-2,12) al 04/08/2026) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 20/08/2026 – 26/08/2026 è inferiore a 0,5 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (<0,5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 13/08/2026 – 19/08/2026) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (20/08/2026 – 26/08/2026) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Tutte le fasce d'età hanno un'incidenza molto bassa (≤ 1 caso ogni 100.000 ab.), eccetto la fascia d'età oltre i 90 anni, con incidenza pari a 1 ogni 100.000 abitanti. L'incidenza settimanale è stabile in tutte le fasce d'età, con un lieve aumento nella fascia d'età oltre i 90 anni (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 50 anni, appena superiore rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 24,3%, in forte diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Alla data di estrazione dei dati (24/8/2026), per il mese di luglio 2026, risultano depositati in I-Co-Gen 4 sequenziamenti, di cui due attribuibili alla variante NB.1.8.1, uno alla variante JN.1 e uno alla variante XFG (fig. 9, fig. 10). Le informazioni riportate potrebbero, pertanto, non riflettere pienamente la distribuzione delle varianti circolanti.



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 26 agosto 2026 | Data di analisi: 27 agosto 2026

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 26/08/2026 (A)	Posti letto totali area medica 26/08/2026 (B)	Occupazione (%) area medica 26/08/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 19/08/2026
Abruzzo	0	1 382	0.0	0.0
Basilicata	0	333	0.0	0.0
Calabria	0	851	0.0	0.0
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	8	9 001	0.1	0.0
FVG	0	1 277	0.0	0.0
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	3	1 251	0.2	0.3
Lombardia	0	10 457	0.0	0.0
Marche	0	973	0.0	0.0
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	17	6 794	0.3	0.3
PA Bolzano	0	500	0.0	0.0
PA Trento	0	517	0.0	0.0
Puglia	0	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	6	5 033	0.1	0.1
Umbria	0	662	0.0	2.9
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	38	6 000	0.6	0.6
ITALIA	310	61 844	0.5	0.5

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 26/08/2026 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 26/08/2026 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 26/08/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 19/08/2026
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	0	889	0.0	0.0
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	0	1 810	0.0	0.0
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	1	570	0.2	0.2
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	3	1 000	0.3	0.3
ITALIA	13	8 785	0.1	0.1

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivati pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 18 maggio 2026



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 18 maggio 2026



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 18 maggio 2026

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di R_t ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 19 agosto 2020

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 20/08/2026 - 26/08/2026	Incidenza* 20/08/2026 - 26/08/2026	Incidenza 13/08/2026 - 19/08/2026	Incidenza 06/08/2026 - 12/08/2026	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	2	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	0	0	<0,5	<0,5	0
Calabria	0	0	<0,5	<0,5	0
Campania	8	<0,5	<0,5	0	0
ER	15	<0,5	<0,5	0	0
FVG	-1	<0,5	<0,5	0	0
Lazio	17	<0,5	<0,5	0	0
Liguria	5	<0,5	1	0	-100
Lombardia	39	<0,5	<0,5	0	0
Marche	0	0	<0,5	<0,5	0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	3	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	3	1	<0,5	0	-
PA Trento	0	0	<0,5	<0,5	0
Puglia	3	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	0	0	<0,5	<0,5	0
Toscana	0	0	<0,5	<0,5	0
Umbria	0	0	<0,5	<0,5	0
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	2	<0,5	<0,5	0	0
ITALIA	96	<0,5	<0,5	0	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 18 maggio 2026



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato nell'area grigia relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 18 maggio 2026

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento