Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3
Report settimanale

Settimana 91

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 29 gennaio 2025

30 gennaio 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

• Al 29/01/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,6% (960 ricoverati), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,8% al 22/01/2025) (tab.1, fig.1). In lieve diminuzione l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,4% (38 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,5% al 22/01/2025) (tab.2, fig.2).

• I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 17 e 36 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nelle fasce 90+ anni pari a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 3 e 6 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

• L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 22 gennaio 2024 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 21/01/2025 è pari a 0,79 (0,68-0,90), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (Rt=0,72 (0,63-0,82) al 14/01/2025)) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

• L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 23/01/2025 - 29/01/2025 è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (2 casi per 100.000 abitanti nella 16/01/2025 - 22/01/2025) (tab.3).

• L'incidenza settimanale (23/01/2025 - 29/01/2025) dei casi diagnosticati è in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata in Liguria (16 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Valle d'Aosta e Molise, in cui non sono stati segnalati casi nella settimana di riferimento (tab.3).

• Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è stabile o in diminuzione in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 68 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

• La percentuale di reinfezioni è il 36% circa, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

• In base ai dati di sequenziamento presenti nella piattaforma nazionale I-Co-Gen, nell'ultimo mese di campionamento consolidato (dicembre 2024, dati al 26/01/2025), si osserva la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di XEC (12/2024: 57%, fig. 9). Tra i diversi lignaggi identificati, il parentale XEC risulta essere il più frequente (12/2024: 42%, fig. 10).

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 29 gennaio 2025 | Data di analisi: 30 gennaio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 29/01/2025 (A)	Posti letto totali area medica 29/01/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 29/01/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 22/01/2025
Abruzzo	18	1 382	1.3	1.4
Basilicata	4	333	1.2	0.6
Calabria	1	851	0.1	0.2
Campania	80	3 714	2.2	2.2
ER	273	9 001	3.0	3.4
FVG	24	1 277	1.9	1.5
Lazio	29	6 421	0.5	0.6
Liguria	24	1 251	1.9	2.8
Lombardia	62	10 457	0.6	0.8
Marche	13	973	1.3	4.0
Molise	0	176	0.0	0.6
Piemonte	29	6 794	0.4	0.8
PA Bolzano	7	500	1.4	1.4
PA Trento	0	517	0.0	0.0
Puglia	6	2 024	0.3	0.4
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	47	5 033	0.9	0.7
Umbria	12	662	1.8	2.3
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	204	6 000	3.4	3.5
ITALIA	**960**	**61 844**	**1.6**	**1.8**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 29/01/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 29/01/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 29/01/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 22/01/2025
Abruzzo	1	181	0.6	0.6
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	10	889	1.1	1.0
FVG	1	175	0.6	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.0
Liguria	3	162	1.9	3.0
Lombardia	3	1 810	0.2	0.3
Marche	0	206	0.0	0.5
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	1	304	0.3	0.3
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	1	570	0.2	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	8	1 000	0.8	0.8
ITALIA	**38**	**8 785**	**0.4**	**0.5**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 21 ottobre 2024



Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 21 ottobre 2024



Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 21 ottobre 2024



Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 29 gennaio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 23/01/2025 - 29/01/2025	Incidenza* 23/01/2025 - 29/01/2025	Incidenza 16/01/2025 - 22/01/2025	Incidenza 09/01/2025 - 15/01/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	18	1	2	2	-50
Basilicata	5	1	1	0	0
Calabria	13	1	1	1	0
Campania	28	1	1	1	0
ER	106	2	3	4	-33.3
FVG	23	2	2	4	0
Lazio	46	1	1	2	0
Liguria	235	16	<0,5	1	-
Lombardia	272	3	6	4	-50
Marche	19	1	5	2	-80
Molise	0	0	2	<0,5	-100
Piemonte	31	1	1	2	0
PA Bolzano	1	<0,5	1	3	-100
PA Trento	3	1	1	2	0
Puglia	49	1	1	3	0
Sardegna	17	1	1	2	0
Sicilia	3	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	147	4	4	5	0
Umbria	3	<0,5	<0,5	0	0
Valle d'Aosta	0	0	1	<0,5	-100
Veneto	114	2	2	3	0
ITALIA	**1 133**	**2**	**2**	**3**	**0**

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 21 ottobre 2024



Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 21 ottobre 2024

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento