

22. G. SACCA e L. RIVOCCHI. — Contributo alla conoscenza faunistica del genere *Sarcophaga* in Italia (*Diptera, Calliphoridae*).

Riassunto. — Gli Autori riportano un elenco delle specie del gen. *Sarcophaga* contenute nella collezione dipterologica dell'Istituto Superiore di Sanità. Tutte le segnalazioni nuove per regioni vengono riassunte nell'acclusa tabella.

Résumé. — Les auteurs donnent une liste des espèces du genre *Sarcophaga* contenues dans la collection diptérologique de l'Institut Supérieur de Santé.

Toutes les informations nouvelles sont résumées, par régions, dans la table annexée.

Summary. — The Authors report a list of species of the genus *Sarcophaga*, from the Diptera collection of the Istituto Superiore di Sanità.

All localities recorded for the first time are summarized, divided by regions, in the enclosed table.

Zusammenfassung. — Die Verfasser berichten über eine Liste der Species der *Sarcophaga*-Art, die sich in der dipterologischen Sammlung des Obersten Gesundheitsinstituts in Rom befindet.

Alle neuen Meldungen, regionenweise geordnet, sind in beiliegender Tabelle enthalten.

La conoscenza faunistica del genere *Sarcophaga* è limitata ad alcune regioni italiane: Lombardia (solo per la provincia di Pavia, BEZZI 1891), Trentino (BEZZI 1892), Piemonte (RONDANI 1862), Emilia (specialmente la provincia di Parma, RONDANI 1862), Toscana (RONDANI 1862, Siena DEI 1867, Isola del Giglio BEZZI 1925, Pian del Mugnone VERITY 1918), Lazio (TUCCIMEI 1911, M. Circeo SACCA e ILLUMINATI 1942), Calabria (BEZZI 1895), Sicilia (RONDANI 1862, MINÀ PALUMBO 1877, BEZZI 1897, Isola di Ustica RIGGIO 1866), Sardegna (COSTA 1857).

Delle rimanenti regioni italiane mancano completamente dati faunistici e, di quelle suddette, tali dati sono molto incompleti, specie nei lavori più antichi. Si trovano saltuarie notizie di *Sarcophaga* raccolte in Italia nelle monografie di BOETTCHER 1912-13, e SEGUY 1941.

In questo primo contributo riportiamo l'elenco completo di tutte le specie della collezione dell'Istituto Superiore di Sanità, escluse quelle raccolte nel M. Circeo prima del 1942, di cui già è stata fatta menzione in un precedente lavoro. Per ciascuna specie viene indicata la esatta, località, la data e il nome del raccoglitore che abbiamo abbreviato nella seguente maniera:

Ca = Castellani Gi = Giordani Man = Mantero Sc = Scossioli
 Ce = Cerruti Il = Illuminati Mar = Martelli Ri = Rivosecchi
 Fe = Festa Mo = Moscardini M = Marcuzzi Sa = Saccà

Per cinque specie: *carnaria*, *haemorrhoidalis*, *melanura*, *misera*, *striata*, diffusissime in Italia, abbiamo considerato inutile riportare per esteso le indicazioni delle località. Riteniamo invece opportuno accludere una tabella (tab. 1) delle regioni italiane e delle specie in esse segnalate per la prima volta; quelle da considerarsi nuove per la nostra fauna sono scritte in corsivo, quelle che nelle monografie di BOETTCHER e SEGUY portano l'indicazione generica di « raccolta in Italia » senza specificare la località, sono contrassegnate con un asterisco.

In questo primo contributo ci siamo limitati allo studio degli esemplari maschi, citando solo quelle femmine che sono nate da allevamento e di cui la determinazione è sicura; i numeri scritti dopo la località, nel testo e che non sono seguiti da altro segno, indicano direttamente gli esemplari maschi studiati.

In un secondo contributo prenderemo in esame altre collezioni esistenti in Italia, gli esemplari femmine e alcuni esemplari maschi di incerta determinazione che abbiamo preferito non citare.

S. agnata ROND.

RONDANI 1862, Toscana: SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo
 Lazio: Castel Porziano, 1 (Sa. leg. 5-39); Roma, 2 (id. 7-48)
 Sicilia: Palermo, 1 (Sa. leg. 5-44); Godrano (id.)

S. albiceps MEIG.

SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo
 Lombardia: Castro, 1 (Sc. leg. 9-39)
 Piemonte: Serravalle, 4 (9-39)
 Liguria: Savona, 1 (Man. leg. 5-38); Genova, 1 (id.); N. S. della Vittoria, 3 (id. 7-44); Varazze, 5 (id. 5-42)
 Toscana: Firenze, 6 (Mar. leg. 9-39); 4 (id.); Montecatini, 2 (9-39)
 Marche: Grottammare, 7 (Ri. leg. 7-40); Fiuminata, 1 (Stradone leg. 7-38)

Lazio: Acilia, 3 (Sa, leg. 6-41); Ariccia, 3 (8-48); 1, (5-51); Montecavo, 1 (id. 7-39); Ostia, 3 (id. 6-41); Velletri 2 (id. 9-41); Fregene, 1 (id. id.); Terracina, 3 (id. 6-50); Ardea, 1 (id. 7-39); Roma, 1, 1, 8, 6 (id. 7-37, 7-39, 8-48, 10-41)

Sicilia: Godrano, 1 (Sa. leg. 6-40)

S. amita ROND.

RONDANI 1862, Emilia: Parma, BEZZI 1891, Lombardia: Pavia, TUCCIMEI 1911, Lazio: Ostia, Veneto: Torre di Benaco ,1 (Hartig leg.); Laguna Veneta, 4 (Gi. leg.)

Lazio: Roma, 1 (Sa. leg. 10-48); Ponte Galeria, 4 (id. id.); 1 ♀ (id. 4-48)

S. ancilla ROND.

RONDANI 1862, Emilia: Parma

Lazio: Castel Porziano, 1 (Sa. leg. 9-38)

S. aratrix PAND.

VERITY 1918, Toscana: Firenze - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo
Lombardia: Lovere. 1 (Sc. leg. 9-39)

Liguria: N. S. della Vittoria. 11 (Man. leg. 6-40); Varazze, 4 (id. 5-42);
Cogoleto, 1 (Fe. leg. 5-37)

Toscana: Firenze, 7 (Mar. leg. 9-39); Montecatini, 1 (9-39)

Marche: Grottammare, 1 (Ri. leg. 8-40)

Lazio: Roma, 1 (Sa. leg. 10-38); 7 (id. 6-40); Genzano, 1 (id. 9-41); P. Galeria, 1 (id. 10-48); Ostia. 2 (id. 7-41); Agro Pontino, 2 (id. 7-50)

Abruzzo: Pescara, 2 (Sa. leg. 10-49)

S. argyrostoma ROB. DESV.

VERITY 1918, Toscana (*falculata*) - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo (id.) —

Emilia: Modena, 3 (Mo. leg. 9-39)

Toscana: Firenze, 1 (Ma. leg. 7-41); Montecatini, 1 (Il. leg. 9-39)

Marche: Grottammare, 5 (Ri. leg. 7-41)

Lazio: Roma, 2 e 2 ♀, 9 e 6 ♀, 3 e 4 ♀, 4, 1, 1, 2, 4 e 8 ♀ (Sa. leg. 2-47, 4-39, 5-41, 5-39, 5-50, 7-49, 8-46, 9-46); Sermoneta, 1 (id. 5-52); Ostia, 1 (id. 4-38); Fregene, 1 (id. 7-41); Genzano, 2 (id. 6-43); Marino, 1 (id. 7-41)

Abruzzo: Parco Nazionale, 1 (Sa. leg. 10-39)

Sicilia: Palermo, 2 (Sa. leg. 4-42)

S. balanina PAND.

SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo
Veneto: Lago di Garda, 1 (Hartig leg. 6-40); Venezia, 2 (M. leg. 8-38)
Lazio: Ostia, 1 (Sa. leg. 7-39); Roma, 1 (Ca. leg. 3-40); Ostia, 2 ♀ e 1, 1
(id. 4-40, 9-40); 7 (Sa. leg. 4-40); Sabaudia, 1 (id. 9-49)

S. carnaria L.

RONDANI 1862, tutta l'Italia - BEZZI 1891, Lombardia: Pavia - BEZZI 1897,
Sicilia - MINÀ PALUMBO 1887, Sicilia - TUCCIMEI 1911, Lazio - VERITY 1918,
Toscana: Firenze - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Gli esemplari esaminati appartengono alle seguenti regioni:

Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Sicilia.

S. consanguinea ROND.

RONDANI 1862, Sicilia e Emilia: Parma - MINÀ PALUMBO 1887, Sicilia,
VERITY 1918, Toscana: Firenze (*Rondani*) - TUCCIMEI 1911, Lazio
Lazio: Roma, 2 (Sa. leg. 10-44); Ostia, 1 (id. 7-40)
Abruzzo: Parco Nazionale, 1 (Sa. leg. 7-38)

S. clathrata MEIG.

RONDANI 1862, Emilia: Parma - BEZZI 1891, Lombardia: Pavia.
Liguria: Giovi di Genova, 1 (Man. leg. 7-41)

S. corsicana VILL.

SÉGUY 1941, Sardegna
Sardegna: Tempio, 2 (Sa. leg. 8-50); Gennargentu, 3 (id. 7-50).

S. crassimargo PAND.

BOETTCHEER 1912 Italia - SÉGUY 1941, dalla Finlandia all'Italia
Liguria: N. S. della Vittoria, 1 (Man. leg. 7-41).
Lazio: Acilia, 1 (Sa. leg. 4-39).

S. crassipalpis MACQ.

BOETTCHEER 1912, Italia - SÉGUY 1941, Italia
Liguria: Genova, 1♀ (Mancini leg. 10-37); 3 (Man. leg. 5-45); N. S. della
Vittoria, 4 (id. id.); Varazze, 3 (id. 5-42); Finalmarina, 1 (3-40).

Toscana: Montecatini, 1 (9-39); Firenze, 1, 1 (Mar. leg. 7-41, 9-39).

Lazio: Sermoneta, 2 (Sa. leg. 6-51)

Sicilia: Palermo, 2 (Sa. leg. 5-42)

Sardegna: Tempio, 1 (Ca. leg. 9-49)

S. cucullans PAND.

BOETCHER 1913, Trieste - SÉGUY 1941, Italia

Veneto: Venezia, 1, 1 (M. leg. 7-37, 8-38); Laguna Veneta, 1 (Gi. leg.)

Marche: Grottammare, 2, 2 (Riv. leg. 7-41, 8-40)

Lazio: Scauri, 1 (Sa. leg. 9-39)

S. cultellata PAND.

Per la prima volta segnalata in Italia.

Liguria: Genova, 1 (S. Filippo leg. 11-46).

S. discifera PAND.

Per la prima volta segnalata in Italia.

Toscana: Firenze, 1 (Venturi leg. 5-48).

S. ferox VILL.

BOETCHER 1913, la indica per la Spagna e Francia meridionale, aggiungendo però di aver osservato un maschio con la etichetta Sicilia classificato come *S. vulnerata*.

Lazio: M. Circeo, 2 (Sa. leg. 6-48); Roma, 1 (id. 9-50).

Sicilia: Caccamo, 1 (Sa. leg. 9-43); Taormina, 1 (id. 11-49).

S. fertoni VILL.

BOETCHER 1913, Italia: Sicilia

Veneto: Laguna Veneta, 1 (Gi. leg.).

Lazio: Ostia, 5, 3 (Ca. leg. 3-40, 4-40); 3 (Sa. leg. id.); 1 (id. 6-40);

Acilia, 3 (id. 9-38); Fiumicino, 1 (id. 4-39).

S. filia ROND.

RONDANI 1862, Toscana ed Emilia: Parma - VERITY 1918, Toscana: Firenze - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Venezia Giulia: Monfalcone, 1 (7-38).

Liguria: N. S. della Vittoria (Man. leg. 7-46); Genova, 1 (id. 7-41).

Toscana: Firenze, 1 (Mar. leg. 9-39).

Marche: Grottammare, 2, 1 (Ri. leg. 7-41, 8-40).

Lazio: Roma, 1, (Sa. leg. 4-38); 2 (Il. leg. 6-40); 2 (Sa. leg. 10-41); Ardea, 1 (id. 7-39); M. Circeo, 1 (id. 6-48); Ostia, 1 (Ca. leg. 4-40); Alatri, 1 (id. 4-48).

Abruzzo: Pescara, 1 (Sa. 10-46).

S. granulata KRAM.

BOETTCHER 1912, Italia.

Veneto: Venezia, 1 (Marcuzzi leg. 8-38).

S. haemorrhoea MEIG.

RONDANI 1862, Piemonte - BEZZI 1895, Calabria - BEZZI 1897, Sicilia: Palermo - VERITY 1918, Toscana: Firenze - TUCCIMEI 1911, Lazio: Frascati, Tivoli.

Liguria: Varazze, 1 (Man. leg. 4-40); N. S. della Vittoria, 11 (id. 7-41); Genova, 1 (id. 5-41).

Toscana: Firenze, 2, 1 (Mar. leg. 5-49, 9-39).

Lazio: Gerano, 1 (Ca. 4-42); Acilia, 1 (id. 3-45).

S. haemorrhoidalis FALL.

RONDANI 1862, tutta l'Italia dalle Alpi alla Sicilia (*nurus*, *cruentata*) - DEI 1868, Toscana: Siena - BEZZI 1891, Lombardia: Pavia - BEZZI 1897, Sicilia: Palermo - BEZZI 1925, Toscana: Isola del Giglio - COSTA 1857, Sardegna - VERITY 1911, Toscana: Firenze - TUCCIMEI 1911, Lazio - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Gli esemplari di questa specie appartengono alle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglie, Sicilia, Sardegna.

S. haemorrhoides BOETT.

BOETTCHER 1913, Italia (*offuscata*, var. *haemorrhoides*) - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo (*id.*).

Lazio: Acilia, 1 (Sa. leg. 5-39).

S. hirticrus PAND.

BEZZI 1897, Sicilia (*agricola*) - VERITY 1918, Toscana: Firenze - TUCCIMEI 1911, Lazio - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Liguria: N. S. della Vittoria, 2 (Man. leg. 7-46); Genova, 1 (id. 7-38).

Umbria: Lippiano, 1 (8-39).

Marche: Grottammare, 1, 1, 3 (Ri. leg. 6-40, 7-40, 8-40).

Lazio: Roma, 1, 1, 1 (Sa. leg. 5-50, 7-39, 9-46); P. Galeria, 1 (id. 10-41); Arsoli, 1 (id. 8-40); Ostia, 2 (id. 7-40); M. Circeo, 1 (id. 6-48); Ardea, 1 (id. 6-47); Terracina, 2 (id. 6-50).

S. incisilobata PAND.

BEZZI 1897, Sicilia (*privigna*).

Piemonte: Torino, 2 (7-38).

Venezia Giulia: Postumia, 1 (8-37).

Liguria: S. M. della Vittoria, 3 (Man. leg. 7-43); Genova, 1 (id. 7-48).

Toscana: Firenze, 1 (Mar. leg. 9-39); 2 (id. 4-40).

Marche: Grottammare, 1, 1, 2 (Ri. leg. 6-40, 7-41, 8-39); Tolentino, 1 (id. 9-39).

Lazio: Roma, 2, 2 (Sa. leg. 10-41, 10-48); Castel Fusano, 1 (id. 7-39); Acilia, 1 (Il. leg. 4-40); 2 (Sa. 10-41); Ostia, 1 (id. 6-41); M. Circeo, 2 (id. 6-48); Ariccia, 1 (id. 8-49); Terracina, 1 (id. 5-50).

Sicilia: Godrano, 1, 2 (Sa. leg. 6-44, 5-44); Caltagirone, 4 (id. 7-42).

S. maculata MEIG.

SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Lazio: Ostia, 6, 2 (Sa. leg. 7-39, 6-41); 1 (Il. leg. 8-39); Castel Fusano, 2 (Sa. leg. 9-48); Ardea, 2 (id. 6-47).

S. melanura MEIG.

RONDANI 1862, Piemonte, Lombardia: Parma, Toscana, Trentino - COSTA 1857, Campania: Napoli - MINÀ Palumbo 1887, Sicilia - RIGGIO 1886, Isola di Ustica - BEZZI 1891, Lombardia: Pavia - BEZZI 1892, Trentino - BEZZI 1895, Calabria - BEZZI 1897, Sicilia - BEZZI 1925, Isola del Giglio - VERITY 1918, Toscana - TUCCIMEI 1911, Lazio - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Gli esemplari esaminati appartengono alle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglie, Sicilia, Sardegna.

S. misera WALK.

SÉGUY 1941, Puglie: S. Vito dei Normanni - VERITY 1918, Firenze (*tuberosa*) - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo (*id.*).

Gli esemplari esaminati appartengono alle seguenti regioni: Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglie, Sicilia, Sardegna.

S. monspellensia BOETT.

SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Lazio: Acila, 2 ♀ (Sa. leg. 9-38); Ostia, 1 ♀ (id. 4-40); 2 ♀ (Ca. leg. id.); 1 ♀ (id. 3-41).

S. nigriventris MEIG.

RONDANI 1862, Emilia: Parma - BEZZI 1891, Lombardia: Pavia - BEZZI 1895, Calabria - TUCCIMEI 1911, Lazio.

Veneto: Laguna Veneta, 1 (Gi. leg.) .

Liguria: N. S. della Vittoria, 2 (Man. leg. 7-41).

Emilia: Modena, 1 (Mo. leg. 9-39).

Toscana: Firenze, 2 (Venturi leg. 6-48).

Lazio: Acilia, 1 (Sa. leg. 9-38); Terracina, 2 (id. 6-50).

Sicilia: Godrano, 2 (5-44).

S. noverca ROND.

RONDANI 1962, Piemonte, Emilia: Parma - BEZZI 1891, Lombardia: Pavia.

Liguria: N. S. della Vittoria, 18 ♀ e 14 (Man. leg. 7-40).

Marche: Grottammare, 1, 1 (Ri. leg. 7-40, 8-39).

Lazio: Acilia, 1 (Ca. leg. 5-45).

S. pandellei ROND.

Liguria: N. S. della Vittoria, 1 (Man. leg. 7-41); Varazze, 1 (id. 6-42).

Toscana: Firenze, 1 (Mar. leg. 9-39); Montecatini, 1 (Ill. leg. id.).

Lazio: Roma, 1 (Sa. leg. 6-41); P. Galeria, 2 (id. 10-41); M. Circeo, 1 (id. 9-49).

Sicilia: Godrano, 3 (Sa. leg. 5-44).

S. penicillata VILL.

Per la prima volta segnalata in Italia.

Sicilia: Messina, 2 (Sa. leg. 5-40).

S. protuberans PAND.

BOETTCHER 1912, Italia.

Liguria: N. S. della Vittoria, 1 (Man. leg. 5-41).

Toscana: Firenze, 6 (Mar. leg. 7-39).

Lazio: Ostia, 2 (Sa. leg. 6-41; Sermoneta, 13 (id. 6-52).

Puglie: Leuca, 1 (Ca. leg. 6-41).

Sicilia: Godrano, 4 (Sa. leg. 5-44).

S. rosellei BOETT.

VERITY 1918, Toscana: Firenze - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Marche: Grottammare, 2, 1 (Ri. leg. 6-41, 7-40).

Lazio: Roma, 1, 1 (Sa. leg. 5-39, 7-48); Terracina, 1 (id. 5-50; 4 (id. 6-50); M. Circeo, 1 (id. 6-48); P. Galeria, 1 (id. 10-41); Castel Fusano, 2 (id. 9-48).

Sicilia: Palermo, 1 (Sa. leg. 4-42); Godrano, 1, 1 (id. 5-44, 6-44).

S. rostrata PAND.

BOETTCHER 1912, Italia.

Lazio: Roma, 4 ♀ e 2 (Sa. leg. 6-41); Terracina, 1 (id. 6-50).

Sicilia: Godrano, 2 (Sa. leg. 5-44); Palermo, 1, 1 (id. 4-42, 5-44).

S. schnabli VILL.

BOETTCHER 1913, la cita per la Corsica ma dice di avere osservato alcuni maschi di «*schnabli*» della collezione Rondani contrassegnati col nome di *eritrura*.

Lazio: M. Circeo, 1 (Sa. leg. 6-48); Roma, 1 (id. 7-48).

Sicilia: Palermo, 1 (Sa. leg. 10-32).

S. scoparia PAND.

RONDANI 1862, Emilia: Parma.

Liguria: N. S. della Vittoria, 6 (Man. leg. 7-42).

S. setipennis ROND.

RONDANI 1862, Piemonte ed Emilia (*puerula*) - BEZZI 1891, Lombardia: Pavia - MINÀ PALUMBO 1887, Sicilia - BEZZI 1897, Sicilia - TUCCIMEI 1911, Lazio - SÉGUY 1941, Sardegna - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Veneto: Mestre, 1 (Gi. leg. 4-34).

Venezia Giulia: Isola Morosini, 2 (M. leg. 4-38); Sdobba, 1 (id. 4-38); Postumia, 1 (id. 8-37).

Lazio: Roma, 1, 5, 1, 1 (Sa. leg. 3-38, 4-40, 6-39, 7-38); Ostia, 1 (Ill. leg. 3-40); 1 (Sa. leg. 4-40); 1 (Ca. leg. 6-40); Acilia, 1, 1, 3 (Sa.

leg. 7-38, 8-39, 9-39); 1 (Ca. leg. 11-40); P. Galeria, 1 (Sa. leg. 10-48); Sermoneta, 1 (id. 6-52); Ariccia, 1 (id. 5-52).

Abruzzo: Pescara, 3 (Sa. leg. 10-49).

S. similis MEAD.

BOETTCHER 1913, Trieste.

Venezia Giulia: Isola Morosini, 1 e 1 ♀ (M. leg. 4-37).

Liguria: N. S. della Vittoria, 4 (Man. leg.).

Toscana: Firenze, 2 (9-39); Montecatini, 2 (Ill. leg. id.).

Marche: Grottammare, 1, 1 (Riv. leg. 6-41, 8-40).

Lazio: Acilia, 1 (Sa. leg. 10-41).

S. sinuata MEIG.

RONDANI 1862, Emilia: Parma (*arvorum*) - CORTI 1897, Lombardia: Pavia (*bezzii*) - BEZZI 1895, Calabria (*arvorum*).

Lazio: Acilia, 1 (Ill. leg. 4-40).

S. spinosa VILL.

BOETTCHER 1912, Trieste.

Veneto: Laguna Veneta, 1 (Gi. leg.).

S. striata FABR.

RONDANI 1862, tutta Italia (*haematodes*) - BEZZI 1891, Lombardia: Pavia (*id.*) - BEZZI 1895, Calabria (*id.*) - BEZZI 1897, Sicilia (*id.*) - MINÀ PALUMBO 1887, Sicilia (*id.*) - VERITY 1918, Toscana: Firenze (*id.*) - TUCCIMEI 1911, Lazio (*id.*) - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Gli esemplari esaminati appartengono alle seguenti regioni: Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglie, Sicilia e Sardegna.

S. subulata PAND.

BOETTCHER 1912, Piemonte: Torino, Marche: Macerata (*laciniata*).

Liguria: N. S. Della Vittoria, 7 (Man. leg. 7-41).

S. terretirostris PAND.

VERITY 1918, Toscana: Firenze - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo.

Veneto: Laguna Veneta, 1 (Gi. leg.).

Liguria: Genova, 1 (Man. leg. 7-38); N. S. della Vittoria, 1 (id. 9-41).

Toscana: Firenze, 3 (Mar. leg.).

Umbria: Lippiano, 2 (8-39).

Marche: Grottammare, 2, 2, 4 (Ri. leg. 6-41, 7-41, 8-40).

Lazio: Roma, 1, 2 (Sa. leg. 3-39, 10-41); M. Circeo, 2 (id. 6-48); Terracina, 4, 3 ♀ (id. 6-50, 7-50); Fregene, 1 (id. 9-41); Arcinazzo, 1 (id. 8-40); C. Fusano, 1 (id. 9-48); Ariccia, 1 (id. 8-40).

Abruzzo: Pescasseroli, 1, 2 (Sa. leg. 7-39, 10-49).

Sicilia: Caltagirone, 1 (Sa. leg. 8-42).

Sardegna: Tempio, 1 (Sa. leg. 8-50).

S. tibialis MACQ.

BOETTCHER 1913, Lombardia: Gargano - SÉGUY 1941, Veneto: Lago di Garda - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo (*beckeri*).

Veneto: Laguna Veneta, 1 (Gi. leg.); Venezia, 1 (M. leg. 8-37).

Liguria: Genova, 1 (Man. leg. 5-39).

Lazio: Roma, 1, 10 e 12 ♀, 2 e 3 ♀ (Sa. leg. 7-39, 8-39, 10-39); Acilia, 1, 1 (Ill. leg. 10-39, 9-41); Terracina, 1 (Sa. leg. 7-40); Scauri, 1 (id. 9-39); Ninfa, 2 (id. 9-49); M. Circeo, 1 (id. 6-48).

Sicilia: Palermo, 2 (Sa. leg. 7-40).

S. uliginosa KRAM.

BOETTCHER 1913, Toscana: Vallombrosa.

Lazio: Ostia, 6 (Sa. leg. 6-41).

S. uncicurva PAND.

BOETTCHER 1913, Lombardia: Pavia, Calabria, Sicilia: Siracusa - VERITY 1918, Toscana: Firenze.

Marche: Grottammare, 1 (Ri. leg. 8-39).

Lazio: M. Circeo, 1 (Sa. leg. 9-39).

S. vagans MEIG.

RONDANI 1862, Emilia: Parma - VERITY 1918, Toscana: Firenze (*frenata*) - SACCÀ e ILLUMINATI 1942, Lazio: M. Circeo (*id.*).

Liguria: N. S. della Vittoria, 1 (Man. leg. 7-43); M. Diamante, 1 (S. Filippo leg. 7-431).

Toscana: Firenze, 2 (Mar. leg. 9-39).

Abruzzo: Parco Nazionale, 2 (Sa. leg. 7-39).

S. vicina.

RONDANI 1862, Emilia: Parma.

Liguria: N. S. della Vittoria, 2 (Man. leg. 7-40).

S. vicina var. meadei.

BOETTCHER 1913, Piemonte: Torino.

Liguria: N. S. della Vittoria, 7 (Man. leg. 7-41).

Lazio: Terracina, 3, 1, 2 (Sa. leg. 5-50, 6-50, 7-50).

Roma — Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di parassitologia.

BIBLIOGRAFIA

- BEZZI M. (1891): Contribuzione alla fauna ditteologica della provincia di Pavia. Bull. Soc. Ent. It., 23, 24-91.
- BEZZI M. (1892): I Ditteri del Trentino. Atti Acc. Sc. Ven. Tr. Istr., 1, 209-353.
- BEZZI M. (1895): Contribuzione alla fauna ditteologica italiana; i Ditteri della Calabria. Bull. Soc. Ent. It., 27, 39-78.
- BEZZI M., DE STEFANI T. (1897): Enumerazione dei Ditteri finora raccolti in Sicilia. Il Naturalista sicil., 2, 25-72.
- BEZZI M. (1925): I Ditteri del Giglio. Ann. Mus. Civ. Genova, 50, 291-354.
- BOETTCHER G. (1912-1913): Die männlichen Begattungswerkzeuge bei dem Genus *Sarcophaga*. Meig, und ihre Bedeutung für die Abgrenzung der Arten (Dipt.). Deut. Ent. Zeit., 5-6 e 1-4, 525-544, 725-736, 23-41, 136-143, 168-185, 254-386.
- CORTI E. (1897): Aggiunte alla fauna ditteologica della Provincia di Pavia. Bull. Soc. Ent. It., 29, 121-124.
- COSTA A. (1882-1886): Notizie e osservazioni sulla geofauna sarda. Atti Acc. Sc. Fis. Nat., Napoli, 1-4.
- DEI A. (1886): Catalogo degli Insetti della Provincia senese. Atti Acc. Fisiocratici, Siena, 4-5.
- MINÀ-PALUMBO F. (1887): Contribuzione alla fauna entomologica siciliana. Il Naturalista sicil., Palermo, 6, 8-9.
- RONDANI C. (1856-59): Dipterologiae italicae prodromus. Parma, Stocchi, ed.
- RIGGIO G. (1866): Materiali per una fauna entomologica dell'isola di Ustica. Il Naturalista sicil., Palermo, 5.
- SACCÀ G. e ILLUMINATI G. (1942): I^a esplorazione entomologica del Parco Nazionale del Circeo. Diptera, Genere *Sarcophaga*. Salerno, M. Spadafora.
- SÉGUY E. (1941): Encyclopédie Entomologique, XXI, II, 44-168. Parigi, Lechevalier ed.
- TUCCIMEI G. (1911): Saggio di un catalogo dei Ditteri della provincia di Roma. Boll. Soc. Zool. It., 191-227.
- VERITY R. (1918): Elenco dei Ditteri raccolti nel pian del Mugnone, presso Firenze. Bull. Soc. Ent. It., 50, 18-22.
-