

MISURE AGGIUNTIVE

Bundle per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico



SIMPIOS

Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie



DA VALUTARE SOLO DOPO L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INCLUSE NEL BUNDLE

FASE pre-operatoria



Informare la persona candidata all'intervento sulla prevenzione delle ISC.

Effettuare screening e decolonizzazione delle persone colonizzate con *Staphylococcus aureus*.




FASE intra-operatoria



Eseguire appropriatamente l'antisepsi di mani/braccia del team chirurgico.

Mantenere la normotermia peri-operatoria con temperatura target $>36^{\circ}\text{C}$.



Mantenere il controllo glicemico intra-operatorio con livelli target di glucosio nel sangue $<150\text{ mg/dL}$ nelle 24-48 ore dopo l'intervento



RICORDA!

Pratica sempre l'igiene delle mani e usa i guanti in modo appropriato.

dicembre 2024

Approvato e condiviso da ACOI, AICO, AMCLI, ANIPIO, SIAARTI, SIC, SICE, SICPRE, SICUT, SIFO, SIM, SIMIT, Siti

progetto grafico • Servizio Comunicazione Scientifica, Istituto Superiore di Sanità