

I CONSIGLI PER DOPO LA VACCINAZIONE SFATURI DUA VACCIN

Romeno/Romana

Dopo la vaccinazione i genitori possono avere dei dubbi su cosa fare se il bambino ha dei disturbi.

Cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti:

Dupa vaccin parintii pot avea indoilei cu privire la ceea ce trebuie sa faca in cazul in care copilul are tulburari.

Incercam sa raspundem la intrebarile mai frecvente:

Il mio bambino è irrequieto. Che cosa devo fare?

Copilul meu este nelinistit. Ce trebuie sa fac?

Dopo la vaccinazione i bambini possono essere particolarmente irrequieti o piangere poiché possono sentire dolore nella sede dell'iniezione o avere la febbre.

Dupa vaccin copiii pot fi foarte nelinistiti sau plangaciosi daca locul vaccinului ii doare sau au febra.

- Si può somministrare un farmaco, il “paracetamolo” che aiuta a ridurre il dolore e la febbre.
Se poate da un medicament, “paracetamolul” care atenueaza durerea si febra.
- Se lo stato di irrequietezza persiste per più di 24 ore consultate il pediatra di base.
Daca starea de neliniste persista pentru mai mult de 24 de ore consultati medicul pediatru de baza.

La sede d'iniezione è calda, gonfia e arrossata. Che cosa devo fare?

Locul vaccinului este cald, umflat si inrosit. Ce trebuie sa fac?

- Applicare un panno pulito e fresco sulla zona dolorosa ed infiammata.
Aplicati un tampon curat si rece pe zona dureroasa si umflata.
- Se ritenete che il bambino abbia molto dolore poiché reagisce alla minima pressione, potete somministrare il paracetamolo, secondo il peso del bambino, come descritto nella tabella sottoriportata.
Daca considerati ca locul este dureros la cea mai mica presiune, puteti sa ii dati paracetamol, in functie de greutate, consultand tabelul de mai jos.

Penso che il bambino abbia la febbre. Che cosa devo fare?

Cred ca copilul are febra. Ce trebuie sa fac?

- Prima di tutto verificate se è vero e misurate la temperatura del bambino.
- Înainte de toate trebuie să verificați temperatura copilului.
- Se il bambino ha la febbre :
 - dategli da bere in abbondanza
 - vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente
 - somministrare il farmaco " paracetamolo " come descritto sotto
- Dacă copilul are febră:
 - dați-i să bea multe lichide
 - îmbracați-l ușor
 - dați-i "paracetamol" urmărind indicațiile de mai jos
- Se il bambino continua ad avere la febbre per oltre 24 ore, se la febbre aumenta o il bambino presenta sintomi insoliti, consultați il pediatra o il pronto soccorso
- Dacă copilul continua să aibă febră mai mult de 24 de ore, dacă febra crește sau copilul prezintă simptome neobișnuite, consultați medicul pediatru sau mergeți la urgență.

DOSAGGI PARACETAMOLO
DOZAJ PARACETAMOL

Peso del bambino Greutatea copilului	GOCCE PICATURI
3,2 - 6 Kg 3,2 - 6 Kg	16 – 23 gocce ogni 6 ore 16 – 23 picaturi la fiecare 6 ore
7 -10 Kg 7 -10 Kg	40 – 46 gocce ogni 6 ore 40 – 46 picaturi la fiecare 6 ore
11 - 12 Kg 11 - 12 Kg	40 – 46 gocce ogni 4 ore 40 – 46 picaturi la fiecare 4 ore

Peso del bambino Greutatea copilului	SUPPOSTE 125 mg SUPOZITOARE 125 mg
6 - 7 Kg 6 - 7 Kg	1 supposta ogni 6 ore 1 supozitor la fiecare 6 ore
7 - 10 Kg 7 - 10 Kg	1 supposta ogni 4 – 6 ore 1 supozitor la fiecare 4 – 6 ore
11 - 12 Kg 11 - 12 Kg	1 supposta ogni 4 ore 1 supozitor la fiecare 4 ore

Peso del bambino Greutatea copilului	SUPPOSTE 250 mg SUPOZITOARE 250 mg
11 - 12 kg 11 - 12 Kg	1 supposta ogni 8 ore 1 supozitor la fiecare 8 ore
13 e 20 kg 13 și 20 kg	1 supposta ogni 6 ore 1 supozitor la fiecare 6 ore